

Proгноza agrometeorologică pentru luna aprilie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.03.2018 Брой: 3/2018



Pe parcursul lunii, pentru a doua decadă este prognozată o probabilitate crescută de formare a înghețului, ceea ce trebuie luat în considerare la întărirea răsadurilor de legume și tutun. La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade în zonele de câmp, temperaturile solului în stratul de 10 cm vor atinge valori potrivite pentru semănatul porumbului boabe, iar la sfârșitul lunii – și pentru culturile de primăvară iubitoare de căldură (bumbac, fasole, arahide, pepeni, pepeni galbeni). În aprilie, umiditatea atmosferică ridicată și ploile frecvente vor menține condiții favorabile pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice

După vremea umedă de la începutul primăverii, în prima decadă a lunii aprilie se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere. Precipitațiile din luna martie, care în multe zone ale țării au depășit de două ori normele lunare (Vidin - 135 l/m², Vrața - 112 l/m², Lom - 119 l/m², Kneja -

104 l/m², Svišov - 104 l/m², Şumen - 101 l/m², Dragoman - 105 l/m², Blagoevgrad - 102 l/m², Haskovo - 104 l/m², Kardjali - 114 l/m², Elhovo - 122 l/m², Sliven - 103 l/m², Karnobat - 118 l/m²), au condus la înmuierea solului în straturile de 50 şi 100 cm şi la întârzieri serioase în efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat şi semănatul culturilor de primăvară timpurii şi medii-timpurii. Din aceste motive, în sudul Bulgariei au fost depăşite termenele agrotehnice pentru semănatul florii-soarelui, care cad în a doua jumătate a lunii martie. Pentru nordul Bulgariei aceste termene sunt în prima decadă a lunii aprilie. În prima decadă, temperaturile prognozate peste normă vor accelera vegetaţia culturilor semănate toamna. În această perioadă, o mare parte a grâului şi orzului din zonele de câmp vor intra în faza de înălţare a tulpinii. La rapiţă se va observa faza de înmugurire.

În majoritatea zilelor din a doua şi a treia decadă, dezvoltarea culturilor agricole va decurge în ritm moderat, la temperaturi apropiate de normele climatice. În a doua jumătate a lunii aprilie va avea loc faza de înflorire la rapiţă. În a treia decadă, grâul şi orzul care au intrat cel mai devreme în faza de înălţare a tulpinii, la mijlocul lunii martie (Plovdiv, Pazardjik), vor intra în faza de înspicare, iar în unele locuri din regiunile sudice se va observa şi faza de înflorire a culturilor.

Precipitaţiile aşteptate în aprilie, în jurul normei lunare, vor menţine rezervele de umiditate a solului în limite optime pentru vegetaţia culturilor semănate toamna şi a culturilor de primăvară semănate.

Pe parcursul lunii, pentru a doua decadă este prognozată o probabilitate crescută de formare a îngheţului, ceea ce trebuie luat în considerare la întărirea răsadurilor de legume şi tutun.

La sfârşitul celei de-a doua şi începutul celei de-a treia decade în zonele de câmp, temperaturile solului în stratul de 10 cm vor atinge valori potrivite pentru semănatul porumbului boabe, iar la sfârşitul lunii – şi pentru culturile de primăvară iubitoare de căldură (bumbac, fasole, arahide, pepeni, pepeni galbeni).

În aprilie, umiditatea atmosferică ridicată şi ploile frecvente vor menţine condiţii favorabile pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice – septorioze la culturile cerealiere de toamnă; la pomii fructiferi – arsura florilor (putregaiul brun timpuriu), pojarul, găurirea frunzelor. Condiţii mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecţie a plantelor vor apărea în majoritatea zilelor primei decade, la începutul şi sfârşitul celei de-a doua decade.

Sursa: INMH