

Condiții adecvate pentru pulverizarea de protecție a plantelor în livezi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.04.2018 Брой: 4/2018



În prima jumătate a lunii aprilie, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm accelerat, la temperaturi peste normele climatice. Pe parcursul perioadei, în regiunile de câmp, culturile de cereale de toamnă se vor afla în faza de înălțare a tulpinii. La rapiță, va avea loc formarea ramurilor și stadiul de înmugurire.

La sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă a lunii aprilie, se așteaptă o stabilizare a vremii și vor apărea condiții favorabile pentru efectuarea tratamentelor urgente de protecție a plantelor în livezi. Precipitațiile de la începutul primăverii au crescut presiunea de infecție a diferitelor boli fungice – ofilirea florală (putregaiul brun timpuriu), găurirea frunzelor, tăbăcirea, etc. La cireș și vișin, tratamentul post-florare împotriva uneia dintre cele mai periculoase boli – cilindrosporioza (rugina albă) – nu trebuie omis.

De asemenea, în perioada următoare, în multe părți ale țării, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului va împiedica realizarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și semănatul întârziat al culturilor de primăvară timpurii și medii-timpurii. Precipitațiile peste normă din martie sunt motivul pentru depășirea termenelor agrotehnice de semănat a florii-soarelui într-o mare parte a regiunilor de câmp ale țării.

Sursa: INMH