

Condiții agrometeorologice favorabile

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.04.2018 Брой: 4/2018



În a treia decadă a lunii aprilie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice. Până la mijlocul perioadei, culturile de cereale de toamnă se vor afla predominant în faza de înălțare a tulpinii. În unele locuri din sudul Bulgariei, grâul și orzul vor trece de la înălțarea tulpinii la înspicare, iar începutul fazei de înspicare va fi observat. În această perioadă, câmpurile de grâu trebuie monitorizate pentru apariția și densitatea populației unuia dintre cei mai importanți dăunători – ploșnița de cereală, precum și pentru dezvoltarea unor boli fungice – septorioza, rugină frunzară și făinarea.

Rapița de toamnă va fi predominant în faza de înflorire. În culturile de floarea-soarelui semănate la sfârșitul primei decade a lunii aprilie, în unele zone ale Câmpiei Dunării – Băzovec, Novachene, Pavlikeni – vor avea loc emergența și stadiul inițial de formare a frunzelor. În livezi, se vor observa stadiile de 1–3 frunze, iar în regiunile

sudice – și separarea inflorescențelor. În această perioadă, trebuie efectuat primul tratament preventiv împotriva făinării (oidium). Condiții mai favorabile pentru efectuarea pulverizărilor de protecție a plantelor vor apărea în prima jumătate a perioadei.

Până la mijlocul celei de-a treia decade, nu se așteaptă precipitații semnificative. În majoritatea regiunilor de câmp, condițiile vor permite lucrările de pregătire a solului și semănarea floarei-soarelui, întârziată semnificativ dincolo de termenele agrotehnice. Temperaturile solului din stratul de 10 cm au valori potrivite pentru semănarea porumbului boabe, iar până la sfârșitul perioadei următoare vor fi potrivite și pentru semănarea culturilor primăvăratice termofile (bumbac, fasole, arahide, pepeni, pepeni galbeni).

Sursa: NIMH