

În primele zece zile ale lunii mai, se va înregistra o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului și un risc de mană în viile de vie.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 08.05.2018 Брой: 5/2018



După vremea uscată și neobișnuit de caldă de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, în următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare semnificativă.

Până la sfârșitul primei decade, se prognozează o scădere a temperaturilor și o normalizare a condițiilor termice. Precipitațiile răspândite așteptate vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului din straturile superioare și condițiile pentru progresul stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor semănate de floarea-soarelui și porumb. Aceste precipitații vor avea un efect benefic asupra grâului, orzului și rapiței de toamnă, care trec prin

faze critice de umiditate. La grâu și orz, stadiul de înspicat va fi observat pe scară largă. În culturile cele mai timpurii înspicate, în a treia decadă a lunii aprilie (stații agrometeorologice: Knezha, Pavlikeni, Țarev Brod, Pazardjik, Plovdiv, Iambol), vor avea loc înflorirea, fertilizarea și formarea boabelor. La rapita de toamnă, va avea loc formarea păstăilor.

În cursul perioadei, în viță-de-vie va avea loc stadiul de separare a inflorescenței. Precipitațiile frecvente și temperaturile mai scăzute de la sfârșitul primei decade vor crește riscul de infectare și dezvoltare a **manei la vița-de-vie**, ceea ce necesită tratament preventiv după stabilizarea vremii. La apariția primelor simptome ale manei, utilizarea fungicidelor sistemic este imperativă. Pentru perioadă se prognozează o probabilitate crescută de grindină. În cazul unor avarii provocate de grindină, culturile pomicole afectate trebuie tratate la prima oportunitate cu fungicide care conțin cupru, pentru a accelera cicatrizarea și a limita riscul de infecții secundare cu patogeni.

Sursa: INMH