

Probabilitatea de apariție a bolilor fungice la mijlocul lunii mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.05.2018 Брой: 5/2018



Temperaturile prognozate și precipitațiile frecvente din perioadă vor crea condiții pentru infecție și dezvoltarea bolilor fungice, cum ar fi: tăciunea la speciile de pomone, gaura de glonț și putregaiul brun timpuriu la semente, mucegaiul cenușiu la căpșuni, mană la viță de vie, etc.

La mijlocul lunii mai, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi apropiate de normele climatice pentru a doua decadă a lunii mai.

Precipitațiile așteptate în perioadă vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm și condițiile pentru dezvoltarea culturilor semănate toamna și a culturilor de primăvară semănate. Precipitațiile înregistrate la

sfârșitul primei decade a lunii mai au fost distribuite neuniform. În unele locuri din zonele de câmp, precipitațiile au fost sub 10 l/m², fără o semnificație economică deosebită. Cantități semnificative, peste 25-30 l/m², au fost măsurate în unele părți ale Câmpiei Dunării și în estul Bulgariei. În regiunea Stara Zagora, ploaia torențială, peste 50 l/m², a provocat culcarea unei părți a suprafețelor cultivate cu cereale de toamnă.

În această perioadă, la floarea-soarelui și porumb va avea loc formarea frunzelor. La culturile de cereale de toamnă, vor avea loc înflorirea, fertilizarea, formarea boabelor și umplerea boabelor. La sfârșitul celei de-a doua decade, o parte din suprafețele cultivate cu orz și grâu din regiunile sudice vor intra în stadiul începutului de coacere lăptoasă, mai devreme decât termenele obișnuite pentru țară. Rapita de toamnă se află în stadiul reproductiv al dezvoltării.

Temperaturile prognozate și precipitațiile frecvente din perioadă vor crea condiții pentru infecție și dezvoltarea bolilor fungice, cum ar fi: tăciunea la speciile de pomone, gaura de glonț și putregaiul brun timpuriu la semente, mucegaiul cenușiu la căpșuni, mană la viță de vie, etc.

În a doua decadă a lunii mai, stadiul de coacere va fi observat la soiurile timpurii de cireș. În această perioadă, musca fructelor de cireș provoacă daune la soiurile semi-timpurii. Tratamentul insecticid împotriva acestui dăunător trebuie efectuat la începutul colorării fructelor de cireș.

Sursă: NIMH