

Musca fructului de cireș (Rhagoletis cerasi L.)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2018 Брой: 5/2018



Acesta este cel mai important dăunător economic al cireșului. Zborul muștelor începe la o temperatură a solului de aproximativ 10°C. Apariția coincide cu coacerea primelor soiuri de cireș. Dăunătorul își depune ouăle în fructele care au început să se coacă. Pagubele sunt provocate de larvă, care se hrănește cu partea cărnosă a fructului. Fructele afectate se înnegresc, putrezesc și se afundă în locul leziunii. Fructele infestate cu viermi sunt nepotrivite pentru consum.

Strategia de combatere a dăunătorului:

Pentru a determina momentul cel mai potrivit pentru combaterea musculiței fructelor de cireș, se pot utiliza capcane combinate, care sunt plasate înainte de infestarea primelor soiuri de cireș. Combaterea musculiței fructelor de cireș este îndreptată împotriva insectei adulte înainte de ovipozitie, pentru care este foarte important să se stabilească începutul zborului musculiței, lucru care se face cu ajutorul capcanelor.

Combaterea chimică a musculiței fructelor de cireș se efectuează împotriva adulților înainte ca aceștia să-și depună ouăle, aproximativ 10–12 zile după începerea zborului.

Produse fitosanitare autorizate:

Vaztak New 100 EC – 0,015%; Decis 2.5 EC – 0,03%; Decis 100 EC – 10–17,5 ml/da; Eforia 045 ZC – 150 ml/da; Calypso 480 SC – 0,02%; Karate Express WG /Ninja /Forza – 60–100 g/da; Karate Zeon 5 CS – 15 ml/da; Naturalis – 100–200 ml/da; Fury 10 EC – 0,0125%.