

Timpul pentru recolta culturilor de toamnă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.06.2018 Брой: 6/2018



În majoritatea zilelor lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă. Precipitațiile preconizate în cea mai mare parte a regiunilor arabile ale țării, în jurul normei lunare, vor menține niveluri bune ale rezervelor de umiditate a solului în straturile de 50 cm și 100 cm – în jurul și peste 70% din capacitatea de câmp (CC). Niveluri mai scăzute ale rezervelor de umiditate sunt prognozate în nord-estul Bulgariei (Razgrad, Ruse, Silistra, Dobrich) și în regiunile sud-vestice (Blagoevgrad), unde precipitațiile din mai au fost semnificativ sub norma lunară.

În prima decadă a lunii iunie, temperaturile prognozate peste normal vor accelera etapele finale de dezvoltare ale culturilor semănate toamna. Rapita va fi în stadiul de coacere. În culturile de cereale de toamnă din câmpurile mai înalte, vor avea loc umplerea bobului și stadiul de coacere lăptoasă. În regiunile arabile, grâul va

trece de la coacerea lăptoasă la cea pâslie și la coacerea pâslie. În orz, se va observa coacerea pâslie și deplină.

În a doua decadă, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru perioadă. Până la mijlocul lunii iunie, se va observa un stadiu de coacere în masă la grâu.

În a treia decadă, condițiile termice prognozate peste normal vor accelera vegetația culturilor agricole. Până la sfârșitul lunii, o parte din culturile de primăvară vor intra în stadiul reproductiv al dezvoltării lor: în culturile de floarea-soarelui semănate mai devreme, se va observa începutul înfloririi, iar la hibrizii timpurii de porumb – înălțarea și înflorirea paniculei.

Temperaturile maxime prognozate în iunie, local până la 35-36°C, vor avea un impact negativ de scurtă durată asupra înfloririi și fertilizării la culturile de câmp și legumicole.

Precipitațiile frecvente din prima jumătate a lunii și grindina așteptată vor menține un risc ridicat de dezvoltare a bolilor fungice: mană în livezi de viță de vie și culturi legumicole (făinarea și Alternaria la roșii), pojar și putregaiul brun târziu la fructe în livezi.

Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor apărea la sfârșitul primei, la mijlocul celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade a lunii iunie.

Sursa: NIMH