

Activitățile de protecție a plantelor continuă în livadă și în luna iunie.

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 07.06.2018 Брой: 6/2018



Temperatura medie lunară în iunie este între 18-22°C pentru zonele de câmpie și 11-16°C pentru câmpiile înalte. Precipitațiile în această lună variază de la 60 la 90 de litri pe metru pătrat.

În iunie, cireșele, vișinele și căpșunul se coc masiv, precum și soiurile timpurii de zmeură, caise, piersici, pere și mere. Îngrijirea pentru protecția culturii de fructe și a pomilor continuă.

În iunie, continuă stropirea pomilor de **măr** împotriva tăcii și a făinării, a moliei merelor, a păduchelui San Jose și a afidelor. Pentru pomii de **pară**, tratamentele împotriva tăcii, a petelor albe și brune de pe frunze și împotriva psilei comune a perelor trebuie continuate.

Pentru **gutui**, este necesară stropirea împotriva putregaiului brun și a moliei fructelor.

În iunie, continuă îngrijirea pentru protecția **perelor, gutuilor și merelor împotriva arsurii bacteriene**. Pentru a limita pagubele, se efectuează tăieri sanitare pentru îndepărtarea ramurilor și lăstarilor infectați (tăiați la 30-40 de centimetri sub punctul de infecție), după care rănila se acoperă cu vopsea pe bază de ulei la care se adaugă produse cu conținut de cupru – Bordeaux mix 20 WP, amestecul Bordeaux, Funguran OH 50 WP, Champion WP. Uneltele de tăiere se dezinfectează după fiecare tăietură cu alcool metilic sau în înălbitor diluat cu apă într-un raport de 1:10. Pe lângă tăiere, pentru a proteja pomii de infecție, se efectuează și stropiri cu: amestec Bordeaux – 1%, Funguran OH 50 WP – 0,15%, Champion WP – 0,15%. În condiții favorabile dezvoltării bolii, la soiurile sensibile, vreme răcoroasă și umedă, precum și în prezența infecției care nu a fost stăpânită în mai, se efectuează stropiri preventive la intervale de 5-7 zile.

Soiurile de cireș și vișin cu coacere mijlocie și târzie la începutul lunii iunie trebuie protejate împotriva cilindrosporiozei (rugina albă), a putregaiului brun și a muștei fructelor de cireș.

Pentru **piersic**, continuă stropirea împotriva făinării, găuririi frunzelor, putregaiului brun, Anarsia, moliei orientale a fructelor și a afidelor.

Împotriva făinării se utilizează unul dintre următoarele fungicide:

Pentru **zmeur** la începutul lunii iunie, se efectuează stropiri împotriva didimelei, antracnozei, arsuri tulpini (leptosferioză), mucegaiului cenușiu, agrilusului zmeurului, tantariului galelor la zmeur și gândacului zmeurului.

Pentru ca stropirile împotriva bolilor și dăunătorilor la culturile pomicole să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în timp util și de calitate. De asemenea, este foarte important să se stabilească necesitatea unui anumit tratament, ceea ce este legat de un monitorizare specifică pentru a determina densitatea populației de dăunători și, atunci când sunt depășite pragurile economice de dăunătoritate, să se efectueze stropiri.

Informații despre fungicidele și insecticidele autorizate pentru utilizare pot fi găsite în numărul 5/2018 al revistei „Protecția Plantelor”.