

Pericol de infectare cu mană la viță de vie și culturi legumicole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.06.2018 Брой: 6/2018



În perioada trecută, condițiile agrometeorologice au fost determinate de o vreme instabilă – caldă, chiar caniculară, cu averse locale.

În perioada 15-21 iunie, vremea va continua să fie instabilă, fiind așteptate averse frecvente și o scădere a temperaturilor. Probabilitatea de grindină și de vătămare a culturilor agricole rămâne.

Conform prognozei condițiilor meteorologice, necesarul de apă al culturilor de primăvară va crește semnificativ în a doua jumătate a perioadei datorită trecerii lor în stadiul reproductiv de dezvoltare. Cele mai mari valori vor fi

În câmpiile din sud-vest și întreaga parte centrală a Bulgariei de Sud și vor atinge valori maxime de până la 36-40 mm pentru perioada respectivă.

În ciuda averselor frecvente, în întreaga țară se observă grade diferite de deficit al rezervelor de umiditate din sol. Valorile deficitului hidric cresc treptat de la nord-est la sud-vest și ating valori maxime de până la 20-26 mm.

La culturile de cereale de toamnă, se vor observa stadiile de laptos, aluat și coacere completă. La floarea-soarelui va avea loc formarea frunzelor și înmugurirea, iar la porumb, formarea frunzelor. În zonele în care rezervele de apă sunt sub optim în stratul de sol locuit de rădăcini, trebuie inițiată irigarea.

Condițiile meteorologice din această perioadă vor menține, de asemenea, riscul de infecție cu mană la viile și culturile legumicole. Molia orientală a fructelor va continua să producă daune la speciile pomicole. Există și riscul de dezvoltare a mănăstruiului și tăiei pe fructe. Vremea caldă și uscată de la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie a favorizat înmulțirea și creșterea populațiilor de afide. La roșii, necroza (înnegrirea), transmisă de afide, provoacă daune, ceea ce impune controlul vectorului. Plantele afectate sunt smulse și îndepărtate.

Condiții potrivite pentru tratamentele împotriva bolilor și dăunătorilor vor apărea spre sfârșitul perioadei, când probabilitatea precipitațiilor se așteaptă să scadă.

Sursa: NIMH