

La sfârșitul lunii iunie, patogenii fungici din culturile legumicole reprezintă o problemă semnificativă pentru fermieri.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 27.06.2018 Брой: 6/2018



În cursul perioadei, riscul dezvoltării și al infectării cu patogeni fungici la culturile legumicole (mana), și la speciile pomicele (făinarea, putregaiul brun, pojarul fructelor) rămâne.

Precipitațiile din a doua decadă a lunii iunie, în majoritatea regiunilor țării, au îmbunătățit rezervele de umiditate a solului din stratul 0–50 cm în suprafețele de câmp și au îmbunătățit condițiile pentru dezvoltarea culturilor de primăvară – porumb și floarea-soarelui.

În perioada următoare, vremea se preconizează a fi variabilă cu averse și scădere a temperaturilor, iar posibilitatea de grindină și de producere a unor avarii la culturile agricole rămâne.

La grâu, vor avea loc fazele de coacere pastoasă și coacere deplină, iar orzul se află în faza de coacere deplină. În nord-estul Bulgariei (Şumen și Glavinița) și în centrul Bulgariei de nord (Kneja), a început de asemenea recoltarea boabelor de orz și grâu. În sudul Bulgariei (Liubimeț, Cearpan, Sandanski), a început de asemenea recoltarea culturilor de cereale de toamnă. Porumbul pentru boabe va fi în faza de dezvoltare a frunzelor, iar la floarea-soarelui va avea loc formarea inflorescențelor. În nordul Bulgariei (Pavlikeni, Bazoveț) și o parte din sudul Bulgariei (regiunea Plovdiv), porumbul va fi în faza de înflorire și formare a paniculei. În aceste regiuni, floarea-soarelui va fi în faza de înflorire. Rapita oleaginoasă va fi în faza de coacere a păstăilor.

În cursul perioadei, riscul dezvoltării și al infectării cu patogeni fungici la culturile legumicole (mana), și la speciile pomicole (făinarea, putregaiul brun, pojarul fructelor) rămâne.

Sursa: INMH