

La începutul lunii iulie, condițiile agrometeorologice vor înregistra o schimbare pozitivă.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 02.07.2018 *Брой:* 7/2018



Precipitațiile răspândite și substanțiale căzute în ultimele zile ale lunii iunie, depășind 50-60 l/m² în multe locuri din Bulgaria de Sud (Pazardjik, Plovdiv, Sliven, Karnobat), au condus la o creștere a rezervelor de umiditate a solului în straturile 0-50 cm și 0-100 cm. În majoritatea regiunilor de câmp, acestea au atins niveluri peste 80-85% din capacitatea de câmp (CC). În unele regiuni sudice, ploile intense au inundat terenurile agricole și au provocat daune – culcarea culturilor de grâu coapte.

În perioada următoare, se prognozează o creștere a temperaturilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru vegetația culturilor de primăvară. Pe parcursul perioadei, la porumb, în funcție de precocitate, se vor observa diferite faze – formarea frunzelor, înțepușirea, înflorirea mănunchiului și formarea știuleților. La floarea-soarelui, pe câmpurile mai înalte, va avea loc formarea inflorescenței, în timp ce în culturile din regiunile de câmp se va desfășura faza de înflorire. La fasole și soia se va observa formarea păstăilor, iar la bumbac – faza de înmugurire.

În a doua jumătate a perioadei, nu se așteaptă precipitații în regiunile de câmp, ceea ce va oferi o oportunitate pentru efectuarea stropirilor urgente de protecție a plantelor. Vremea umedă de la sfârșitul lunii iunie a creat condiții pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice: mana la roșii; mană făinoasă la castraveți; pojar și putregaiul brun târziu la pomii fructiferi, ceea ce va necesita utilizarea fungicidelor sistematice.

Până la mijlocul primei decade a lunii iulie, în multe părți ale țării, conținutul ridicat de umiditate din straturile superioare ale solului va îngreuna recoltarea culturii de cereale coapte.

Sursa: INMH