

Îngrijirea pentru conservarea recoltei de fructe și a pomilor continuă și în luna iulie

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 11.07.2018 Брой: 7/2018



Temperatura medie lunară pentru majoritatea țării în iulie este între 21-26°C. Precipitațiile în această lună sunt de scurtă durată și foarte des deficitare. În această perioadă, în unele regiuni continuă recoltarea cireșelor și vișinelor cu coacere târzie, iar în livezile de măr, prun și piersic începe recoltarea fructelor de la soiurile timpurii. Creșterea lăstarilor în iulie se încheie, fructele sporesc intens în dimensiuni, iar procesul de formare a mugurilor floriali începe.

În **livezile de măr** unde nu a apărut infecția de tăciune, tratamentele împotriva acestei boli sunt întrerupte. În prezența infecției pe frunze și fructe și cu ploii frecvente, așa cum este situația în acest moment, riscul infecțiilor

tardive și al creșterii gradului de avariere a fructelor persistă, ceea ce face necesar în acest caz continuarea tratamentelor în această perioadă.

Pentru soiurile de măr sensibile la făinarea, tratamentele împotriva acestei boli continuă de asemenea. Pentru combaterea simultană a ambelor boli, cel mai bine este să se utilizeze fungicide care sunt eficiente împotriva ambilor patogeni.

În iulie, tratamentele împotriva viermelui merelor, păduchelui roșu californian și moliilor minieroare nu trebuie neglijate nici ele.

Pentru **par**, tratamentele trebuie să continue împotriva tăciunelui, petelor albe și brune de pe frunze și împotriva psilei părului. Tratamentele fungicide la **gutui** sunt direcționate împotriva putregaiului brun și a petelor brune de pe frunze, iar în soluția de stropit se adaugă un insecticid împotriva viermelui merelor. La **prun**, tratamentele din iulie sunt direcționate împotriva putregaiului brun, ruginii, moliei fructelor de prun și a păduchelui obișnuit al prunului.

La începutul lui iulie, fructele soiurilor timpurii de piersic încep să se coacă și în această perioadă nu se efectuează tratamente asupra lor. Pentru **soiurile târzii de piersic**, este necesar să se trateze împotriva făinării, putregaiului brun, Anarsia, moliei orientale a fructelor și a afidelor.

Produsele fitosanitare aprobate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în iulie pot fi găsite în revista „Protecția Plantelor”, numărul 6/2018.