

În a doua decadă a lunii iulie, nu se preconizează modificări semnificative ale condițiilor climatice.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.07.2018 Брой: 7/2018



În prima jumătate a celei de-a doua decadă a lunii iulie se preconizează o schimbare pozitivă pe termen scurt a condițiilor agrometeorologice. Precipitațiile frecvente și în multe zone ale țării intense din prima decadă a lunii iulie au perturbat desfășurarea lucrărilor de câmp și au împiedicat recolta grâului. În unele zone din Nord-Vestul și Centrul Bulgariei (Vrața – 85 l/m², Montana – 84 l/m², Lom – 118 l/m², Kneja – 81 l/m², Pleven – 77 l/m², Loveci – 88 l/m², Veliko Tărnovo – 120 l/m²), în câmpia Sofia (Sofia – 118 l/m²) și în regiunile sudice (Kărdjali, Carnobat), cantitatea de precipitații a depășit norma lunară. În câmpii individuale s-au înregistrat culcare, îmbibarea cu apă a culturilor de grâu și înmugurirea boabelor în spic.

Precipitațiile prognozate în a doua jumătate a perioadei vor întârzia în plus recolta grâului, ceea ce va duce la o deteriorare a calității recoltei de boabe nerecoltate.

Până la sfârșitul celei de-a doua decade, dezvoltarea culturilor de primăvară va progresa la temperaturi apropiate de normele climatice. În cursul perioadei, la floarea-soarelui vor avea loc înflorirea, fertilizarea și umplerea semințelor. La porumb, în funcție de precocitate, se vor observa diferite faze – de la înmugurire la hibrizi târzii până la maturitatea lăptoasă la hibrizii timpurii de porumb în unele locuri din Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Bazoveț) și în regiunile sudice (stația agrometeorologică Plovdiv). La soia va avea loc formarea masivă a păstăilor (stația agrometeorologică Pavlikeni), iar la bumbac – faza de înflorire.

Vremea umedă din perioada trecută și grindina care a avut loc au crescut riscul de răspândire și dezvoltare a unei serii de boli fungice: mana și Alternaria la roșii; putregaiul cenușiu la soiurile timpurii de struguri de masă, mană la vița de vie, putregaiul brun târziu și pojarul la pomii fructiferi.

Condiții pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor exista la începutul perioadei. Se recomandă utilizarea fungicidelor cu acțiune sistemică cu un interval adecvat pre-recoltare, în concordanță cu perioada de coacere a culturilor.

Sursa: INMH