

Rezervele de umiditate a solului ridicate pentru sezon în luna august

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.08.2018 Брой: 8/2018



În luna august, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de precipitațiile prognozate peste normă și de temperaturi apropiate de normele climatologice pentru această lună.

La începutul lunii august, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc în condiții de rezerve de umiditate a solului neobișnuit de mari pentru sezon, la adâncimile de 50 și 100 cm. În unele dintre zonele de câmp, pentru culturile de primăvară (porumb, floarea-soarelui), acestea depășesc 90% din capacitatea de câmp (CC), ca urmare a precipitațiilor semnificative din luna iulie, care în multe locuri din țară au atins și au depășit de două ori norma lunară (Vrața - 138 l/m², Montana - 117 l/m², Lom - 134 l/m², Cneazna - 150 l/m², Lovech – 138 l/m², Veliko

Tărnovo – 159 l/m², Şumen – 143 l/m², Ruse – 120 l/m², Sofia - 177 l/m², Plovdiv – 127 l/m², Kazanlâk – 129 l/m², Kardjali – 120 l/m², Elhovo şi Carnobat – 134 l/m²).

În majoritatea zilelor primei decadă, condițiile agrometeorologice vor rămâne instabile, cu ploi frecvente care vor întârzia finalizarea recoltării grâului şi vor deteriora şi mai mult calitatea culturii de cereale nerecoltate. Vremea umedă prognozată va creşte riscul de răspândire şi dezvoltare a putregaiului cenuşiu la struguri, în special în livezile afectate de grindina din iulie. Condițiile din această perioadă vor rămâne optime pentru dezvoltarea moniliozei târzii la pomii fructiferi şi pentru manei la culturile legumicole.

În prima decadă, hibrizii timpurii de porumb îşi vor finaliza dezvoltarea. La hibrizii semi-timpurii, se va observa stadiul de coacere lăptoasă. La floarea-soarelui, va fi în curs de desfăşurare umplerea semințelor. O parte din culturile din Câmpia Dunării şi din regiunile de sud-est vor intra în stadiul inițial de coacere.

În a doua decadă, se aşteaptă o creştere substanțială a temperaturilor şi o accelerare a ritmurilor de dezvoltare ale culturilor agricole târzii. Temperaturile maxime prognozate, local până la 36-37°C, vor avea un impact negativ de scurtă durată asupra înfloririi şi fertilizării la culturile legumicole din producția de câmp târzie. La sfârşitul celei de-a doua şi începutul celei de-a treia decade, se va observa coacerea tehnologică în masă la floarea-soarelui.

În a treia decadă, hibrizii semi-târzii de porumb vor intra în stadiul de coacere cerată. La hibrizii târzii, va fi în curs de desfăşurare umplerea boabelor şi stadiul de coacere lăptoasă. La soia, se va observa stadiul de coacere, iar la bumbac – deschiderea capsulelor. În decursul decadei, stadiul de coacere lăptoasă va predomina la orez.

În luna august, condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor vor apărea la începutul lunii şi în majoritatea zilelor celei de-a doua decade.

În a doua decadă, se aşteaptă o îmbunătățire a condițiilor pentru aratul adânc şi pentru pregătirea pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță de toamnă. Termenul agrotehnic pentru semănatul rapiței începe în a treia decadă a lunii august.

Sursa: INMH