

Starea fitosanitară a culturilor agricole la 09.01.2014 Grâu și orz

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 16.10.2014 Брой: 10/2014



În primele zile ale lunii august, condițiile agrometeorologice din vestul Bulgariei au rămas instabile. Acest lucru a împiedicat și mai mult recoltarea grâului și a înrăutățit calitatea boabelor. Până la sfârșitul lunii, recolta de grâu nu fusese încă finalizată în zonele mai înalte ale provinciilor Kyustendil, Pernik și Sofia. La mijlocul lunii august, atmosfera s-a stabilizat, temperaturile au crescut, iar în diferite părți ale țării maximele au atins între 33-38°C.

În a doua jumătate a lunii august, o parte din culturile de primăvară și-au încheiat dezvoltarea. A început recolta de floarea-soarelui și semănatul rapiței. În sudul Bulgariei, în zonele cu precipitații mai reduse în timpul sezonului, a început și recolta porumbului hibrid timpuriu.

GRÂU ȘI ORZ

Condițiile agrometeorologice instabile au înrăutățit calitatea boabelor, iar în culturile recoltate târziu s-a observat apariția unor patogeni fungici din genul *Alternaria* (Vidin, Vrața, Pernik, provincia Sofia, Stara Zagora, Târgoviște etc.). Precipitațiile din lunile de vară au provocat o înrăvășire secundară cu buruieni a suprafețelor curățate după recolta culturilor de cereale și a rapiței. În provinciile Blagoevgrad, Vrața, Lom, Razgrad și Ruse, este în desfășurare o campanie de tratare a ogourilor cu erbicide totale, cu prioritate pentru suprafețele destinate resemănatului cu cereale. Până în prezent, au fost tratate aproximativ 114 mii decare. În timpul anchetelor efectuate în luna august pe ogoare, margini de câmp și benzile de lângă drumuri, s-a observat o tendință de gradație în dezvoltarea șoarecelui de câmp.

Datorită înrăvășirii puternice cu buruieni și prezenței vegetației proaspete, densitatea populației de dăunători înregistrată este în jurul și peste Pragul Economic (PE în toamnă: 2 colonii active/decare). Pe ogoarele de la culturile de toamnă și rapiță, în provinciile Pleven, Razgrad, Ruse și Stara Zagora, densitatea înregistrată a șoarecilor variază de la galerii individuale la 2 colonii active/decare. Până la 3 colonii active/decare au fost înregistrate în provinciile: Burgas, Varna, Vrața, Dobrici, Kyustendil și Loveci. În provinciile Pernik și Târgoviște, densitatea înregistrată este de 2-7 colonii active/decare. În provincia Șumen, a fost înregistrată o densitate de 2-18 colonii active/decare. Dacă condițiile climatice favorabile vor continua în toamna anului 2014, se așteaptă o multiplicare în masă a șoarecilor de câmp în nordul Bulgariei și pe câmpurile din partea vestică a țării. În sudul Bulgariei, în regiunile provinciilor Plovdiv, Stara Zagora, Iambol și Burgas, se așteaptă de asemenea o creștere a numărului de șoareci de câmp și de șoareci casnici est-mediteraneeni. Continuă anchetele pentru monitorizarea dinamicii dezvoltării rozătoarelor murine. Tendința în dezvoltarea rozătoarelor murine este: creșterea numărului, activitatea dăunătoare și extinderea arealului lor.