

În august, pericolul bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi încă nu a trecut.

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 23.08.2018 Брой: 8/2018



Pentru soiurile de măr sensibile la făinarea mărului, continuă și combaterea acestei boli. Pentru controlul simultan al tăcii, este recomandabil să se utilizeze fungicide eficiente împotriva ambilor patogeni. Soiurile rezistente la tăciune – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, etc., se tratează doar împotriva făinării.

În august, se efectuează tratamente și împotriva petelor amare la măr. Daunele provocate de această tulburare neinfecțioasă se observă în perioada de coacere și ulterior, în timpul depozitării. Fructele afectate sunt punctate cu numeroase pete întunecate, adâncite, care sunt cel mai adesea concentrate în partea inferioară a fructului. Ulterior, acestea devin mai intense la culoare; la fructele roșii capătă o culoare roșie-închisă, în timp ce la

fructele galbene și verzi devin verde-deschis până la verde. Uneori, merele afectate nu prezintă simptome externe și nu se deosebesc de cele sănătoase, dar atunci când sunt tăiate, sunt vizibile adâncituri maronii împrăștiate printre carnea sănătoasă. Pata amară constă dintr-un țesut spongios maro-închis, cu gust amar. Pentru a preveni această tulburare, se efectuează tratamente de două până la trei ori cu CaCl_2 - 0,6 %. Prima stropire se efectuează cu aproximativ o lună înainte de recoltare, iar cele ulterioare la intervale de 10-12 zile. Se recomandă și foliarul Wuxal Calcium – 300-600 ml/ha. Cu acesta, se efectuează un minim de 6 stropiri, prima după legarea fructelor, iar cele ulterioare la intervale de 12-15 zile. Este necesar să se evite stresul hidric la pomi, iar recoltarea trebuie efectuată la cele mai favorabile termene pentru fiecare soi.

În prima jumătate a lunii august, continuă combaterea celei de-a doua generații de viermele mărului.

Mai există măsuri de protecție a plantelor de luat în cazul părului, cireșului, piersicului și căpșunului.

În producția ecologică utilizarea pesticidelor sintetice nu este permisă. Pentru combaterea bolilor fungice, se utilizează fungicide cu cupru și cu sulf. Pentru combaterea viermelui mărului și a moliei orientale a fructelor, sunt omologate Madex Top și Madex Twin – 10 ml/ha, precum și dispozitivele – RAK 3+4 pentru viermele mărului și RAK 5+6 și FEROCAN AM pentru molia orientală a fructelor. Naturalis OD este inclus în lista de produse pentru combaterea psilei obișnuite a părului.

Pentru combaterea minatorului foliar al petelor la măr, bioinsecticul eficient este Neem Azal T/S – 300 ml/ha.

Sineis 480SC este autorizat pentru utilizare la: căpșun împotriva tripsului; cais, piersic și nectarină împotriva viermelui ramurilor de piersic; păr împotriva psilei părului; și măr împotriva viermelui mărului și a minatorului foliar al petelor.

Informații despre produsele de protecție a plantelor omologate împotriva diferitelor boli și dăunători în august pot fi găsite în numărul 7/2018 al revistei „Protecția Plantelor”.