

Proгноză agrometeorologică pentru septembrie 2018

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2018 *Брой:* 9/2018



La începutul lunii septembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme uscată, caldă și, local în regiunile de câmpie, caniculară. Până la mijlocul primei decade, condițiile vor fi favorabile pentru finalizarea recoltării floarea-soarelui, culesul hibrizilor timpurii de porumb, efectuarea arăturilor adânci, a lucrărilor pregătitoare pentru semănat și semănatului rapiței de toamnă.

Condițiile termice peste normă prevăzute la începutul lunii vor accelera parcurgerea fazelor finale de dezvoltare ale culturilor de câmp tardive. La hibrizii de porumb semi-târzii se vor observa fazele de coacere ceară și coacere deplină, iar la hibrizii târzii – faza de lapte și trecerea de la coacerea în lapte la coacerea în ceară. La orez va predomina faza de coacere în lapte, iar la bumbac – deschiderea păstăilor.

În a doua jumătate a primei și în majoritatea zilelor celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor fi foarte dinamice. Se prevăd precipitații, scădere a temperaturilor și un risc crescut de dezvoltare a patogenilor care provoacă putregaiuri – putregaiul brun tardiv (*Monilia fructigena*) la fructele soiurilor de pomi fructiferi de toamnă-iarnă, și putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*) la soiurile târzii de viță de vie pentru vin. În acest an, vara ploioasă a împiedicat aplicarea la timp a tratamentelor de protecție a plantelor în livezi. În unele locuri, infecțiile masive cu mană și făinare au compromis recolta de struguri.

În a doua decadă a lunii septembrie, și hibrizii târzii de porumb vor intra în fazele de coacere ceară și coacere deplină. În această perioadă, în culturile de orez se va observa pe scară largă faza de înmugurire.

La sfârșitul celei de-a doua decade, se prevăd probabilități crescute de formare a brumei în câmpiile mai înalte, iar în a treia decadă – și în unele dintre regiunile de câmpie, ceea ce impune recoltarea la timp a culturilor legumicole sensibile la îngheț.

Precipitațiile așteptate în septembrie, în jurul și peste norma lunară, vor asigura umiditatea necesară pentru parcurgerea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale rapiței de toamnă. La sfârșitul lunii, la rapita semănată în fereastra optimă, în prima jumătate a lunii septembrie, se va observa faza de înălțare. În faza de înălțare, pagube grave la rapită sunt provocate de ploșnița-neagră a verzei (adult) și de larvele (false omizi) ale muscării ferăstrăului rapiței.

În a doua parte a celei de-a treia decade, nu se prevăd precipitații semnificative. În ultimele zile ale lunii, se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru semănat pe suprafețele destinate semănatului cu culturi cerealiere de toamnă. La sfârșitul lunii septembrie, în câmpiile mai înalte, încep perioadele agrotehnice pentru semănatul orzului și grâului.

Sursa: INMH