

În livadă în septembrie – tratamentele chimice se reduc

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 18.09.2018 Брой: 9/2018



Temperaturile în septembrie scad și de obicei maximele nu depășesc 25°C. Frunzișul copacilor continuă să fotosintezeze activ și asigură nutriția fructelor (pentru soiurile de toamnă și iarnă), diferențierea mugurilor fructiferi și depunerea substanțelor nutritive de rezervă. În această lună, pentru majoritatea speciilor de pomi fructiferi nu este necesar să se efectueze tratamente, dar deși mai puține, acestea sunt totuși necesare.

În livezile de **măr**, se efectuează stropiri împotriva infecțiilor tardive cu tăciune și a agenților cauzatori ai putregaiului fructelor în timpul depozitării, din ciupercile genurilor *Monilinia*, *Penicillium*, *Botritis*, *Alternaria*, *Botryosphaeria*, etc. Daunele provocate de viermele mărului continuă de asemenea.

Soiurile de măr ale căror fructe vor fi recoltate în a doua jumătate a lunii septembrie trebuie stropite cu insecticide cu un interval scurt pre-recoltare.

Pentru **soiurile târzii de păr** trebuie continuat combaterea moliilor fructelor (viermele mărului, molia orientală a fructelor și molia parului) și a agenților cauzatori ai putregaiului fructelor. Se utilizează insecticidele și fungicidele indicate pentru măr.

Fructele soiurilor de **gutui** cultivate în țara noastră sunt foarte sensibile la putregaiul brun târziu, mucegaiul cenușiu și putregaiul moale, care sunt deosebit de dăunătoare în perioadele cu precipitații frecvente în timpul coacerii fructelor și ulterior în timpul depozitării. Aceasta necesită efectuarea de stropiri împotriva acestor patogeni. Pentru a proteja fructele de infestarea cu viermele mărului și molia orientală a fructelor, se adaugă de asemenea un insecticid în soluția fungică.

Informații despre produsele de protecție a plantelor necesare pentru stropire în această perioadă pot fi găsite în numărul 8/9 2018 al revistei „Protecția Plantelor”.