

Gândacul mugurilor de păr cauzează pagube grave nu numai la păr

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.10.2018 Брой: 10/2018



Gândacul mugurilor de păr (*Anthonomus pyri* Kollar) este răspândit în întreaga țară și provoacă pagube grave nu numai părului, ci și mărului, caisului și prunului.

Dăunătorul este un mic gândac cu bot care dezvoltă o generație pe an. Își depune ouăle în mugurii de păr toamna și iernează acolo sub formă de ou. Larvele care eclozează primăvara distrug complet mugurii fructiferi, drept urmare din aceștia nu se dezvoltă nici o floare. Mugurii fructiferi afectați nu se dezvoltă în timpul înfloririi, se usucă și cad.

Lupta

Lupta este îndreptată împotriva adulților, înainte ca aceștia să-și depună ouăle – la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie. După 20 septembrie este indicat să se efectueze controale prin scuturarea pomilor, iar atunci când se constată o medie de peste 5–8 gândaci pe pom, trebuie începută stropirea și finalizată în 5–6 zile.

În livezile de păr unde nu s-a efectuat o luptă regulată împotriva dăunătorilor, gândacul mugurilor de păr se înmulțește de obicei, iar densitatea populației sale depășește adesea pragul economic de dăunare – 5–8 indivizi pe pom, ceea ce impune stropirea împotriva adulților înainte de depunerea ouălor cu Dursban 4E – 0,15% sau Vaztak New 100EC – 0,0125%, etc. Lupta împotriva acestui dăunător este eficientă doar împotriva formelor adulte la începutul toamnei. Mai târziu, larvele gândacului mugurilor de păr se dezvoltă în interiorul mugurilor, iar pagubele sunt detectate primăvara, când lupta împotriva lor nu mai este posibilă.