

Proгноză agrometeorologică pentru a doua decadă a lunii octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.10.2018 Брой: 10/2018



În următoarea perioadă de șapte zile (12-18.10.2018) condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vremea uscată prognozată și de temperaturi peste norma pentru a doua decadă a lunii octombrie. În multe părți ale țării seceta se va intensifica, ceea ce va întârzia și mai mult pregătirea solului înainte de semănat pentru suprafețele destinate culturilor de cereale de toamnă și rapiță. În unele dintre regiunile de câmp există un deficit de umiditate în stratul de sol de 50 cm, iar în unele locuri din vestul Bulgariei (stația agrometeorologică Kyustendil) – și în stratul de 100 cm. Excepții apar în unele localități din regiunile sudice și sud-estice (Haskovo, Kardzhali, Stara Zagora, Burgas), unde la începutul lunii octombrie au căzut precipitații de semnificație economică – peste 30 l/m².

Datorită condițiilor nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului, în multe părți ale țării au fost depășite termenele agrotehnice pentru semănatul rapiței de toamnă în luna septembrie. La începutul celei de-a doua decade a lunii octombrie expiră intervalul optim de timp pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei. La mijlocul lunii începe perioada agrotehnică pentru semănatul cerealelor de toamnă în sudul Bulgariei.

În următoarea perioadă, în majoritatea țării deficitul de umiditate al solului va întârzia stadiile inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semămate. În locații izolate din Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Bazovets), culturile de grâu semămate devreme, în a treia decadă a lunii septembrie, se află în stadiul de germinare, iar pentru aceste culturi există un risc real de desiccare a răsadurilor.

În perioada respectivă, condițiile vor fi potrivite pentru finalizarea recoltării strugurilor și pentru recoltarea soiurilor târzii de pomi fructiferi.

Următoarea perioadă este potrivită pentru plantarea cepei și usturoiului pentru producția verde, precum și a ridichii pentru producția de toamnă târzie.

Sursa: NIMH