

Starea fitosanitară a culturilor agricole la 01.09

Cartofi

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 17.10.2014 Брой: 10/2014



În primele zile ale lunii august, condițiile agrometeorologice din vestul Bulgariei au rămas instabile. Acest lucru a împiedicat și mai mult recoltarea grâului și a înrăutățit calitatea boabelor. Până la sfârșitul lunii, recoltarea grâului încă nu se încheiase în zonele mai înalte ale provinciilor Kyustendil, Pernik și Sofia. Până la mijlocul lunii august, atmosfera s-a stabilizat, temperaturile au crescut, iar în diferite părți ale țării maximele au ajuns între 33-38°C.

În a doua jumătate a lunii august, o parte din culturile de primăvară și-au încheiat dezvoltarea. A început recoltarea floarea-soarelui și semănatul rapiței. În sudul Bulgariei, în zonele cu precipitații mai reduse în timpul sezonului, a început și recoltarea porumbului hibrid timpuriu.

CARTOFI

Fenofaza: semi-timpurii – "recoltare"

târzii – "creșterea tuberculilor" - "ofilirea firului" Precipitațiile abundente și prelungite din perioada de vegetație a cartofului au crescut procentul de tuberculi putreziți ca urmare a umidității excesive a solului.

Gândacul Colorado al Cartofului

În perioada de vegetație, au fost efectuate de la 1 la 4 tratamente împotriva dăunătorului pe 120,2 mii decare. În provincia Plovdiv, s-a raportat eclozarea larvilor din a treia generație a gândacului Colorado al cartofului începând cu 8 august.

Molia Tuberculilor de Cartof

În provinciile Blagoevgrad, Kyustendil și Sofia, persistă un zbor slab al moliilor dăunătorului pe capcanele cu feromoni. În regiunea Blagoevgrad, s-a efectuat tratament pe 1,0 mii decare.

Viermii Tăciuni Subterani

Începutul ecloziei omizilor din a doua generație a fost stabilit în provincia Blagoevgrad, ZEA-Razlog. Pagube la tulpinile plantelor au fost confirmate în provincia Sofia, ZEA-Samokov, unde densitatea înregistrată a fost foarte mare – 5 omizi/mp. Tratamentul a fost efectuat pe o suprafață de 4,7 mii decare în regiunile: Blagoevgrad, Kyustendil și provincia Sofia.

Mancha Târzie a Cartofului

Precipitațiile de la începutul lunii au creat condiții pentru perioade de incubatie suplimentare ale manchei târzii a cartofului la soiurile târzii de cartof și pentru o creștere a gradului de atac al patogenului.

Gradul de atac înregistrat în provinciile Blagoevgrad, Vratsa și Pleven este de 5-25% atac pe frunze (scor 1-2). În regiunea Smolyan, atacul pe frunze ajunge la 30-40% (scor 3), iar în zone individuale din ZEA Razlog și Pernik, frunzele sunt afectate de la 30 la 75% (scor 3-4). Deja la extragerea soiurilor timpurii de cartof, s-a confirmat avarierea tuberculilor din cauza manchei în culturi individuale din provinciile Gabrovo, Kyustendil, Pazardzhik și altele. În timpul extinderii cartofului în august, s-au înregistrat până la 15-20% tuberculi atacați în provincia Sofia și până la 30% în regiunea Blagoevgrad. 119,3 mii decare au fost tratate de la 1 la 8 ori.

În cursul lunii august, răspândirea petelor brune de pe frunze (Alternaria) a continuat. Au fost înregistrate zone infectate cu un grad de atac în regiunea Blagoevgrad de la 3 la 10% și în regiunea Smolyan de la 10 la 15%. 94,142 mii decare au fost tratate de la una la șase ori.