

Proгноza agrometeorologică pentru începutul lunii noiembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2018 Брой: 11/2018



În perioada trecută, condițiile agrometeorologice au fost determinate de vreme caldă, cu temperaturi peste normal și fără precipitații de semnificație economică. Factorul limitativ pentru dezvoltarea culturilor agricole a fost seceta atmosferică și pedologică continuă. Conținutul insuficient de apă din stratul superior de sol a împiedicat lucrările de calitate ale solului și semănatul grâului și orzului în termenii agrotehnici. Conform informațiilor de la parcelele de observație ale rețelei agrometeorologice a INMH, dezvoltarea fenologică a culturilor de toamnă este diferită, în funcție de rezervele de apă disponibile în stratul superficial de sol. La stațiile Knezha, Sliven și Ivaylo, pregătirea pre-semănat a fost efectuată, dar semănatul nu a început. În Karnobat, semănatul a fost finalizat, dar germinarea nu a fost înregistrată. Cea mai răspândită fază observată este

germinarea, care a fost înregistrată în Nikolaevo, Razgrad, Tarev Brod, Șabla, Iambol, Plovdiv și Haskovo. Începutul emergenței a fost raportat în Bazovets, iar emergența de masă în D. Chiflik și Silistra. Cele mai avansate în dezvoltare sunt culturile semănate devreme în Novacene, Pavlikeni și Glavnița.

În următoarea perioadă de șapte zile, vremea se va caracteriza din nou prin temperaturi peste norma climatică, iar precipitațiile de semnificație economică sunt puțin probabile. De asemenea, în această perioadă, factorul care va limita dezvoltarea normală a culturilor de toamnă va fi umiditatea insuficientă din stratul superficial de sol. Se așteaptă ca culturile germinate să intre în faza de emergență.

În această perioadă, în culturile de grâu și orz aflate în formarea frunzelor, trebuie efectuat monitorizarea apariției șobolanului de câmp comun. Măsurile de combatere a dăunătorului trebuie să înceapă atunci când sunt prezente două colonii active pe decar.

Condițiile vor fi potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă în livezi. Pentru speciile cu fructe pepene (măr, păr), se recomandă tratamentul cu o soluție de uree de 5% pentru a limita infecțiile cu tăciune. După căderea masivă a frunzelor, la speciile cu sâmbure este necesar să se aplice tratamentul cu amestecul Bordeaux 2% împotriva arsurii bacteriene, buhăului piersicului, găuririi frunzelor și putregaiului brun timpuriu.

Sursa: INMH