


Proгноza agrometeorologică pentru luna noiembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2018 Брой: 11/2018



În majoritatea zilelor primei decade a lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme uscată și caldă pentru anotimp. Precipitațiile slabe prognozate spre sfârșitul decadei nu vor avea semnificație economică și nu vor conduce la o schimbare substanțială a stării stratului superior de sol. La sfârșitul lunii octombrie, într-o mare parte a regiunilor de câmp, nu exista umezeală productivă în stratul de sol de 50 cm, iar în unele zone din sud-vestul Bulgariei (stațiile agrometeorologice Kyustendil, Sandanski) – nici în stratul de 100 cm. Seceta din prima jumătate a toamnei a împiedicat, în multe zone ale țării, realizarea operațiunilor sezoniere de lucrare a solului și, din acest motiv, în unele regiuni de câmp, termenele agrotehnice pentru semănatul rapiței de toamnă, grâului și orzului au fost depășite. Până la mijlocul lunii noiembrie, deficitul de umiditate a solului va

rămâne un factor limitativ pentru dezvoltarea culturilor de toamnă semănate. În unele zone ale regiunilor de câmp, absența umidității în stratul superior de sol va pune sub semnul întrebării supraviețuirea unei părți a culturilor germinate.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, se prognozează precipitații și o îmbunătățire a condițiilor pentru desfășurarea stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor de cereale de toamnă. În această perioadă, dezvoltarea culturilor se va desfășura la temperaturi medii zilnice apropiate de normele climatice. La sfârșitul lunii noiembrie, stadiul dominant de creștere al grâului și orzului va fi stadiul celei de-a treia frunze. În unele părți ale Câmpiei Dunării, pentru o mică proporție a culturilor de cereale de toamnă semănate în termenul agrotehnic (stațiile agrometeorologice: Băzovec, Novachene, Pavlikeni, Glavinitsa, Silistra), care au răsărit în octombrie și au format 1–2 frunze, se va observa stadiul de încolțire. Stadiul de răsărire va fi în desfășurare la culturile semănate mai târziu, în noiembrie. La rapita, se va observa formarea frunzelor. O mică proporție a culturilor semănate la începutul toamnei va atinge începutul stadiului de rozetă (5–6 frunze) până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe parcursul lunii, temperaturile minime negative prognozate (până la minus -7°C) sunt peste pragurile critice pentru culturile de cereale de toamnă care se află în stadiul de răsărire.

La începutul lunii noiembrie, condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă în livezi. Pentru speciile cu fructe pepene (măr, păr), se recomandă o soluție de uree 5% pentru limitarea infecțiilor cu tăciune. Pentru speciile cu sâmbure, după căderea în masă a frunzelor, trebuie efectuat un tratament cu soluție de bordelez 2% împotriva arsurii bacteriene, bubocului de piersic, găuririi frunzelor și putregaiului brun timpuriu.

În noiembrie, condiții mai favorabile pentru plantarea pomilor fructiferi vor apărea în a doua și a treia decadă. În condițiile climatice ale țării, plantarea de toamnă a culturilor pomicole este recomandată, cu excepția nucului.

Sursa: INMH