

Starea fitosanitară a culturilor agricole la 01.09. Culturi Pomicole

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



În primele zile ale lunii august, condițiile agrometeorologice din vestul Bulgariei au rămas instabile. Acest lucru a împiedicat și mai mult recoltarea grâului și a înrăutățit calitatea boabelor. Până la sfârșitul lunii, recoltarea grâului încă nu se încheiase în zonele mai înalte ale provinciilor Kyustendil, Pernik și Sofia. La mijlocul lunii august, atmosfera s-a stabilizat, temperaturile au crescut, iar în diferite părți ale țării maximele au atins între 33-38°C.

În a doua jumătate a lunii august, o parte din culturile de primăvară și-au încheiat dezvoltarea. A început recoltarea floarea-soarelui și semănatul rapiței. În sudul Bulgariei, în zonele cu precipitații mai reduse în timpul sezonului, a început și recoltarea porumbului hibrid timpuriu.

CULTURI POMICOLĂ

Fenofaza: "creșterea fructului" - "coacere"

În cursul lunii august, a început recoltarea soiurilor de măr mijlocii-timpurii - Primrouge și Mollies Delicious, a soiurilor de păr - Starkrimson, Williams, Clapp's Favorite, și a soiurilor de prun - Green și Althanova Renklode. Sunt recoltate soiurile de piersic mijlocii-târzii - Cresthaven, Glohaven, Hale, precum și soiurile destinate prelucrării. Pe parcursul lunii, s-a observat vătămare din cauza bolilor și dăunătorilor, împotriva cărora se desfășoară măsuri de protecție a plantelor, pulverizările fiind coordonate cu perioada de recoltare a fructelor și cu perioadele de carantină ale produselor de protecție a plantelor utilizate.

Molia prunului

Zborul moliei prunului continuă în capcanele cu feromoni, dar intensitatea acestuia este în scădere. Continuă și activitatea dăunătoare a larvelor de generația a doua a dăunătorului. Procentul de protecție a culturii este bun. Vermifugarea permisă este între 2-6%. Pentru combaterea moliei prunului de generația a doua, au fost tratate 39,36 mii decare de la 1 la 4 ori.

Acarieni Eriofizi

În cursul sezonului vegetativ actual, în regiunea Kyustendil s-a observat vătămare masivă din cauza acarienilor eriofizi din genul *Aculus*. Vătămrile au fost constatate în principal în pepinierele de fructe și în livezile nou înființate de prun, pe frunze și lăstari. În livezile tinere de fructe, vătămrile au atins până la 20% din lăstarii afectați.

Viespea sâmburelui prunului

În ultimii trei ani, în livezile de prun din nord-estul Bulgariei, s-a observat căderea masivă a fructelor în perioada umflării acestora. În interiorul fructelor căzute prematur, atunci când sâmburele este spart, se găsesc larve. Agentul cauzator este un nou dăunător, identificat în 2014 de Laboratorul Central de Carantină Vegetală ca fiind viespea sâmburelui prunului (*Eurytoma schreineri*). Procentul de infestare cu acest dăunător a crescut de-a lungul anilor, atingând până la 90% din fructe în acest an. Pentru a determina momentul precis pentru combaterea viespei sâmburelui prunului, este necesar să se efectueze observații regulate asupra dezvoltării dăunătorului.

Putregaiul brun târziu

S-au observat apariții masive ale putregaiului brun târziu pe fructele de prun în provinciile Pernik, Lovech, Kyustendil, Sliven și Targovishte. Infestațiile cu boala variază de la atac slab la moderat. În total, au fost tratate 8,50 mii decare, tratamentul fiind efectuat în regiunile Lovech și Sliven în cursul lunii august.