

Deficitul de umiditate a solului rămâne un factor limitativ pentru vegetația culturilor de toamnă semănate.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.11.2018 Брой: 11/2018



În mijlocul lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatice. Nu se prognozează precipitații de semnificație agronomică, iar deficitul de umiditate a solului va rămâne un factor limitativ pentru vegetația culturilor de toamnă semănate. Din acest motiv, emergența culturilor de cereale de toamnă semănate la începutul lunii noiembrie va fi întârziată, iar în unele locuri supraviețuirea unei părți din culturile care au germinat la sfârșitul lunii octombrie va fi pusă la îndoială. Ca urmare a deficitului de umiditate, o parte din culturile cu grâu, orz și rapiță de toamnă sunt slab instalate. Pe parcursul perioadei, în culturile de cereale de toamnă se vor observa diferite faze: emergență, formarea inițială a

frunzelor și faza celei de-a treia frunze, în principal în culturile semănate în primele zece zile ale lunii octombrie în părți ale Câmpiei Dunării (Băzovec, Novachene, Pavlikeni, Glavinitsa).

Ca urmare a lipsei de umiditate, dezvoltarea rapiței de toamnă este, de asemenea, în urmă. Pe parcursul perioadei, vor predomina culturile de rapiță cu 3–4 frunze formate. Excepții vor apărea în unele dintre cele mai timpurii culturi semănate, în septembrie, în anumite localități din regiunile de sud-est, unde se va observa și începutul fazei de formare a rozetei.

În a doua decadă a lunii noiembrie, în culturile de toamnă, în special cele cultivate în monocultură, monitorizarea trebuie continuată pentru a identifica cei mai importanți dăunători din punct de vedere economic și densitatea populației acestora: în rapiță pentru infestarea de către puricele de căpățână; în grâu și orz – pentru populația de șoarece de câmp comun, și pentru pagubele provocate de larvele gândacului frunzelor de grâu și muștelor cerealelor. Când densitatea dăunătorilor depășește pragul economic al dăunătorității (PED), sunt necesare măsuri de protecție a plantelor la timp.

În perioada următoare, condițiile vor fi potrivite pentru curățarea suprafețelor de culturile târzii în rânduri (porumb, soiuri mai târzii de varză de cap, culturi rădăcinoase). A doua decadă este un moment potrivit pentru plantarea pomilor fructiferi.

Sursa: INMH