

La sfârșitul lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate de o dinamică sporită.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.11.2018 Брой: 11/2018



După seceta prelungită de toamnă, precipitațiile sub formă de ploaie și zăpadă de la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decadă a lunii noiembrie, în multe zone ale țării depășind 40-50 l/m² (Razgrad-57 l/m², Șumen-57 l/m², Ruse-60 l/m², Haskovo-50 l/m², Kardjali-50 l/m², Șirpan-65 l/m², Stara Zagora-60 l/m², Sliven-59 l/m²), au condus la depășirea deficitului de umiditate din straturile superioare ale solului pentru culturile semănate toamna. Aceste precipitații sunt prea târzii pentru o parte din culturile de cereale de toamnă care, ca urmare a lipsei de umiditate, se află într-o fază inițială de vegetație și pun sub semnul întrebării iernarea lor cu succes.

În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate de o dinamică sporită. La începutul și la sfârșitul perioadei, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice pentru majoritatea țării, cu excepția regiunilor sudice, sunt sub minimul biologic necesar pentru vegetația grâului, orzului și rapiței de toamnă. La sfârșitul lunii noiembrie, în nordul Bulgariei, unde se preconizează și ninsoare, culturile semănate toamna vor intra într-o stare de repaus relativ.

În sudul Bulgariei, vegetația cerealelor de toamnă și a rapiței de toamnă va progresa într-un ritm încetinit și nu se așteaptă o schimbare substanțială în dezvoltarea fenologică a culturilor.

La sfârșitul lunii noiembrie, vor fi observate următoarele faze de creștere ale grâului și orzului: încolțire, a treia frunză și începutul încălțării, în principal în culturile din partea centrală și de nord-est a Câmpiei Dunării.

La rapita, va predomina faza cu 4-5 frunze. O mică parte din culturile semănate la începutul toamnei se află la începutul fazei de formare a rozetei (a 6-a frunză).

În cursul perioadei, condiții mai favorabile pentru finalizarea plantării de toamnă a pomilor fructiferi vor apărea la mijlocul celei de-a treia decadă a lunii noiembrie.

Sursa: INMH