

Proгноză agrometeorologică pentru luna decembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.12.2018 Брой: 12/2018



În luna decembrie, temperaturile prognozate, în jurul și sub normele climatice, vor menține culturile de toamnă în stare de repaus în majoritatea zonelor țării. Excepții sunt posibile pentru culturile semănate toamna în unele localități din părțile sud-vestice îndepărtate ale țării și de-a lungul coastei sudice a Mării Negre. În perioadele relativ mai calde, din mijlocul primei și în a doua jumătate a celei de-a treia decadă, în aceste regiuni pot apărea condiții pentru o reluare pe termen scurt a proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă și rapiță, dar nu se așteaptă o schimbare a fazelor fenologice ale culturilor.

Anul acesta, o parte semnificativă a culturilor de toamnă a încetat vegetația insuficient întărită, într-o etapă inițială a dezvoltării, ceea ce pune sub semnul întrebării iernarea cu succes a acestora. Seceta prelungită a

întârziat semănatul și desfășurarea fazelor inițiale de vegetație la grâu, orz și rapița de toamnă. Ca urmare a deficitului de umiditate al solului, în unele locuri culturile semănate toamna nu au răsărit (Stația Agrometeorologică Sofia). Diferențele în starea fenologică a culturilor de cereale de toamnă sunt considerabile. Culturile de grâu vor intra în iarnă în faze diferite: răsărire, trei frunze și începutul încovoierilor. O mică parte dintre ele, în special cele din regiunile centrale și nord-estice ale țării (Pavlikeni, Razgrad, Țarev Brod, Silistra, Provadia, Dolen Ciflic) se află în faza de încovoială, în care plantele iernează cu succes.

La rapiță, predomină culturile care au format 3–5 frunze. Ponderea culturilor de rapiță care au încetat vegetația în faza de rozetă – faza adecvată pentru iernare – este mică. În decembrie, valorile prognozate ale temperaturilor minime, până la minus 15°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai prelungită, sunt critice pentru culturile de cereale de toamnă aflate în fazele de răsărire și trei frunze, precum și pentru culturile de rapiță care nu au reușit să formeze o rozetă.

Precipitațiile așteptate în decembrie, în limitele normale, vor spori rezervele de umiditate din sol în stratul de 50 și 100 cm. După precipitațiile extinse din a doua jumătate a lunii noiembrie, în multe zone ale țării depășind 50–60 l/m², deficitul acut de apă din straturile superioare ale solului la culturile de toamnă a fost depășit.

Sursa: INMH