

Starea fitosanitară a culturilor agricole la 09.01 Floarea-soarelui

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



În primele zile ale lunii august, condițiile agrometeorologice din vestul Bulgariei au rămas instabile. Acest lucru a împiedicat și mai mult recoltarea grâului și a înrăutățit calitatea boabelor. Până la sfârșitul lunii, recoltarea grâului nu se încheiase încă în zonele mai înalte ale provinciilor Kyustendil, Pernik și Sofia. La mijlocul lunii august, atmosfera s-a stabilizat, temperaturile au crescut, iar în diferite părți ale țării maximele au atins între 33-38° C.

În a doua jumătate a lunii august, o parte din culturile de primăvară și-au încheiat dezvoltarea. A început recoltarea floarea-soarelui și semănatul rapiței. În sudul Bulgariei, în zonele cu precipitații mai reduse în cursul sezonului, a început și recoltarea porumbului hibrid timpuriu.

FLOAREA-SOARELUI

Fenofaza: "coacere" – "recoltare"

Cultura se află într-o stare fitosanitară foarte bună. În timpul vegetației floarea-soarelui, rezervele de umiditate a solului în majoritatea provinciilor țării au fost în limite optime. În luna august, a fost înregistrată o incidență crescută a **pătării brune a frunzelor (phomopsis)** în provinciile Vidin, Veliko Tarnovo și Pernik – între 7 și 15% din plante au fost afectate. Manifestări de **alternaria** cu incidență slabă până la moderată au fost prezente în zonele Vidin, Pernik, Targoviște și Șumen. Vremea umedă cu temperaturi moderate a favorizat dezvoltarea **mucegaiului cenușiu** pe capitulele de floarea-soarelui. Plante individuale cu pete pe capitule au fost găsite în provincia Pernik. Incidența ajunge până la 5,8% din plante în provincia Silistra pe o suprafață de 15 mii decare. În provincia Silistra, pe o suprafață de 15 mii decare, incidența ajunge până la 5,8% din plante. Recoltarea culturii a început.