

Proгноză agrometeorologică pentru ianuarie 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2019 *Брой:* 1/2019



În luna ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și sub normele climatice, ceea ce va menține culturile semănate toamna și plantațiile perene în stare de repaus.

O parte din culturile de cereale de toamnă vor trece iarna insuficient învățate, în stadii timpurii de dezvoltare (încolțire, 2–3 frunze) – consecință a secetei prelungite din toamnă și a semănatului întârziat. O mică parte din plantele de grâu și-au încetat vegetația în faza de încolțire, care este faza adecvată pentru iernare.

În majoritatea zilelor primei decade a lunii ianuarie, vremea rece prognozată, cu temperaturi negative scăzute până la minus 15–18°C, iar în bazine până la minus 20°C, va pune culturile semănate toamna și unele plantații

perene la o încercare serioasă. Astfel de valori ale temperaturii aerului, în condiții fără strat de zăpadă și cu persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru cerealele de toamnă insuficient învățate, în special pentru plantele aflate în stadiile de încolțire și al treilea frunz. Temperaturile minime de acest ordin vor prezenta, de asemenea, risc de îngheț pentru rapița de toamnă. O parte semnificativă a plantelor de rapiță, ca urmare a deficitului de umiditate, nu a reușit să formeze o rozetă (de 7–8 frunze) în timpul vegetației de toamnă – o fază în care plantele au o rezistență crescută la frig. Valorile prognozate sub minus 16–18°C vor fi periculoase pentru mugurii de viță de vie, în special ai soiurilor de struguri de masă, iar sub minus 18°C – și pentru mugurii fructiferi ai unor specii de arbuști (zmeur).

În decada a doua și a treia, condițiile agrometeorologice vor fi mai dinamice. În nordul Bulgariei și pe câmpiile înalte, unde se așteaptă precipitații în principal sub formă de zăpadă, culturile semănate toamna vor fi protejate de un strat permanent de zăpadă.

În sudul Bulgariei, se așteaptă precipitații sub formă de ploaie și zăpadă, iar în unele locuri vor apărea condiții pentru formarea unei cruste de gheață în stratul superficial al solului, ceea ce este o premisă pentru ridicarea culturilor și deteriorarea mecanică a sistemului radicular al cerealelor de toamnă.

În ianuarie, în perioadele relativ mai calde, de-a lungul coastei Mării Negre și în valea râului Struma, o parte din culturile semănate toamna vor trece de la repaus profund la repaus relativ, dar probabilitatea reluării proceselor vegetative la cerealele de toamnă și rapiță este scăzută.

Precipitațiile așteptate în cursul lunii, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate a solului în straturile de sol de un metru și mai adânci. După seceta prelungită de la sfârșitul toamnei, s-a înregistrat o creștere substanțială a rezervelor de umiditate a solului. În unele locuri din nordul Bulgariei, la stațiile agrometeorologice Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Targovishte și în Câmpia Traciană Superioară – Plovdiv, Ivailo, pentru cerealele de toamnă în straturile de 50 și 100 cm acestea au atins niveluri peste 90% din capacitatea de câmp (CC). Rezerve mai mici, 70–80% din CC, se observă în partea de est și sud-vest a țării (Dolen Chiflik, Sliven, Kyustendil).

În ianuarie, condiții mai potrivite pentru tăierea pomilor fructiferi vor apărea în decada a treia.

Sursa: INMH