

La sfârșitul lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate de o dinamică sporită.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.01.2019 Брой: 1/2019



La sfârșitul lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice din țară vor fi din ce în ce mai dinamice. În nord-vestul Bulgariei, în câmpiile înalte și în unele locuri din Câmpia Dunării, unde se preconizează precipitații, inclusiv zăpadă, la începutul perioadei, culturile semănate toamna vor rămâne într-o stare de repaus.

În Bulgaria de Est și în regiunile sudice, se prognozează temperaturi peste normal și diferențe semnificative în condițiile agrometeorologice. În a doua jumătate a perioadei, în regiunile extreme sudice și sud-estice, unde se așteaptă temperaturi maxime de până la 10-14°C, valorile medii zilnice vor fi apropiate de minimul biologic

necesar pentru vegetația culturilor de cereale de toamnă. În sud-estul Bulgariei, în culturile de grâu și orz care se află în stadiile inițiale de dezvoltare (încolțire, 1-3 frunze), procesele vegetative vor decurge într-un ritm încetinit.

În ultima săptămână a lunii ianuarie, precipitațiile răspândite, local semnificative, așteptate vor spori rezervele de umiditate a solului toamna-iarna chiar și în stratul de doi metri de sol. La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decadă, după topirea zăpezii, la culturile de cereale de toamnă din multe regiuni ale țării (stații agrometeorologice: Băzovets, Knezha, Nikolaevo, Pavlikeni, Tărgoviște, Silistra, Sofia, Kyustendil, Sandanski, Pazardzhik, Kazanlăk, Karnobat), rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru au atins niveluri la și peste 95% din capacitatea de câmp (CC). Excepții apar în unele locații din Bulgaria de Est (stații agrometeorologice: Tsarev Brod, Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven), unde nivelul rezervelor de umiditate în straturile de 50 și 100 cm este cel mai scăzut, între 75-85% din CC.

În cursul perioadei, precipitațiile frecvente prognozate vor împiedica implementarea anumitor activități agrotehnice – fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte azotate, și tratamentul de iarnă a pomilor fructiferi cu fungicide care conțin cupru (amestecul Bordeaux, Bordomix).

Sursa: INMH