

# Proгноza agrometeorologică pentru februarie 2019

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 06.02.2019 Брой: 2/2019



În prima decadă a lunii februarie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normal. În unele dintre regiunile de est și sud ale țării, ca urmare a vremii neobișnuit de calde persistente de la sfârșitul lunii ianuarie și a temperaturilor ridicate prognozate la începutul lunii februarie, se vor crea condiții pentru reluarea vegetației la culturile de cereale de toamnă. În locuri izolate din sud-estul Bulgariei, unde se așteaptă valori maxime peste 15–16°C, există probabilitatea ca unele specii de pomi fructiferi cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) să iasă din starea de endodormență.

La sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. Răcirea așteptată va restabili starea de dormență la culturile semănate toamna și va împiedica o

vegetație nedorită, prematură, în unele plantații perene din regiunile sudice.

În a doua jumătate a lunii februarie, temperaturile prognozate, apropiate de normele climatice, vor menține culturile agricole de iernat într-o stare de repaus în majoritatea părților țării. Excepții se vor observa de-a lungul coastei Mării Negre și în regiunile sudice, unde în a treia decadă temperaturile medii zilnice se vor apropia de minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

În februarie, valorile prognozate ale temperaturilor minime, până la minus 13°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, vor prezenta un risc pentru grâul și orzul în faza de 1–3 frunze, precum și pentru culturile de rapiță care nu au format o rozetă. La sfârșitul lunii ianuarie, în unele locuri din regiunile de sud-est, s-a înregistrat o deteriorare parțială prin îngheț la unele culturi semănate toamna care iernează în stadiile inițiale de dezvoltare. Aceste culturi, în cele mai reci zile din ianuarie (06–09.01), nu au fost protejate de un strat de zăpadă.

Precipitațiile prognozate în februarie se așteaptă să fie apropiate de norma lunară și vor spori rezervele de umiditate sol-autumnă-iarnă din stratul de sol de doi metri. La sfârșitul lunii ianuarie, rezervele de umiditate din sol la grâu în stratul de un metru, cu excepția unor regiuni estice, au atins niveluri până la capacitatea de câmp (CC). Precipitațiile frecvente din cursul lunii vor menține un conținut ridicat de umiditate în straturile superioare ale solului, ceea ce în multe părți ale țării va îngreuna implementarea unor activități agrotehnice – fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate, pregătirea solului pentru semănatul suprafețelor destinate culturilor de primăvară timpurii (mazăre, mazărice, ovăz, orz de primăvară).

Condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierii în livezi și vii vor apărea în prima și a treia decadă. În zonele unde s-au înregistrat temperaturi negative scăzute sub minus 15–16°C, este recomandabil ca tăierea soiurilor de struguri de masă să fie efectuată după prelevarea de probe pentru a determina amploarea eventualelor deteriorări provocate de îngheț.

*Sursa: NIMH*