

Болезни и вредители земляники и малины в мае

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



В случае с **малиной** опрыскивания направлены против дидимеллы, антракноза, усыхания оснований побегов/лептосфериоза/, серой гнили, малинного жука-усача, малинной галлицы, малинного стеблевого галлового комарика и малинного жука. Против болезней используется один из следующих фунгицидов: Дитане М45 – 0,2%, Коцид 200 ВГ – 0,12%, Фунгуран ОН 50 СП – 0,15% и Купрозет Голд М – 0,15%. Для борьбы с вредителями малины инсектицид, включенный в список разрешенных средств защиты растений, отсутствует. Согласно Цоловой, 2002, эффективными против указанных вредителей являются инсектициды Би-58 – 0,1%, Каратэ Зеон – 0,02%, Вазтак Нью – 0,015% и Децис 2,5 ЕС – 0,04%. Автор рекомендует использовать первые два инсектицида при первом опрыскивании, а остальные два — при

втором. При появлении клещей применяется НимАзал ТС в концентрации 0,3–0,5%. Этот биопрепарат также воздействует на тлей и цикадок.

Плантации земляники в мае опрыскивают против серой гнили, мучнистой росы, землянично-малинного долгоносика и земляничного стеблевого долгоносика. Против серой гнили используется один из следующих фунгицидов: Свитч 62,5 ВГ – 100 г/да, Сигнум ВГ – 75 г/да, Синпро СК – 150 мл/да, Каптан – 150 г/да, Тирам 80 ВГ – 0,3%, Шавит Ф ВДГ – 0,2%, Пролектус 50 ВГ – 80–120 г/да. Для защиты земляники от мучнистой росы опрыскивание проводят одним из разрешенных фунгицидов: Систан 20 ЭВ – 30 мл/да, Систан Экбзон ЭВ – 55–130 мл/да, Сидели Топ ДЦ – 10 мл/да, Ортива Топ СК – 100 мл/да, Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%, Тиовит Джет 80 ВГ – 500 г/да. Из перечисленных фунгицидов Сидели Топ ДЦ также эффективен против белой пятнистости листьев.

Против долгоносиков используется Авант 150 ЭС – 25 мл/да или Калипсо 480 СК – 20 мл/да.