

Куница может нанести серьезный ущерб плодам вишни

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



Золотистая бронзовка – *Cetonia aurata* L. широко распространена по всей стране. Она повреждает плодовые деревья, отдавая предпочтение вишне и груше. Также встречается на виноградной лозе, розе и шиповнике. Кроме того, было установлено, что она причиняет вред кукурузе и капусте. Чаще всего она встречается на цветках шиповника и розы. Также питается цветочными частями ромашки, кориандра и тысячелистника.

В последние годы золотистая бронзовка наблюдалась в некоторых вишневых садах и приусадебных участках в районе Кюстендила. Ее плотность популяции выше на заросших сорняками участках, в

зарослях шиповника и вишневых садах. На отдельных деревьях было зарегистрировано до 80–100 жуков.

Взрослое насекомое — это относительно крупный жук. Длина тела достигает 2 см. Переднеспинка и надкрылья интенсивно-зеленого цвета с золотистым металлическим блеском. Брюшная сторона медно-красного цвета. На надкрыльях имеются белые поперечные полосы.

Золотистая бронзовка имеет одно поколение в год. Жуки зимуют в почве. Весной они появляются во время цветения плодовых деревьев. Жуки активны и летают в полдень, когда теплее всего. Они обгрызают тычинки и пестики цветков, а также повреждают листья и плоды.

На зараженных плодах вишни они выгрызают глубокие раны и в большинстве случаев полностью уничтожают их. На одном дереве мы зафиксировали 80% поврежденных плодов.

Вред

Оплодотворенные самки откладывают яйца в гнилую древесину и в почву, богатую перегнившей древесиной. Личинки развиваются в этой разлагающейся среде и окукливаются в том же году.

Химическая борьба с золотистой бронзовкой должна быть направлена на взрослую стадию, которая наносит основной вред. Инсектициды до сих пор не тестировались против этого вредителя, так как он не встречался часто. Борьба также осложняется тем, что опрыскивание необходимо проводить во время созревания плодов и необходимо соблюдать сроки ожидания.

Меры борьбы

Золотистая бронзовка относится к семейству Пластинчатоусые, куда также входит мохнатая бронзовка. Рекомендуется использовать инсектициды с коротким сроком ожидания до сбора урожая, которые разрешены против мохнатой бронзовки: Vaztak Nov 100 EC – 10 мл/да. Также можно использовать светло-голубые или белые ловушки с аттрактантом. Для снижения ущерба, причиняемого золотистой бронзовкой, также необходима хорошая агротехническая практика – регулярная обработка почвы, удобрение, сбор, удаление и уничтожение сорной растительности, кустов шиповника и разлагающихся растительных остатков, где развиваются личинки вредителя.