

Агрометеорологический прогноз на месяц ИЮНЬ

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



В течение большей части первой и второй декад июня агрометеорологические условия будут определяться неустойчивой погодой. В начале месяца развитие сельскохозяйственных культур будет проходить замедленными темпами, при температурах ниже нормы. До середины первой декады во многих районах страны прогнозируются осадки, которые улучшат запасы влаги в почве в слое 50 см и условия для вегетации яровых культур. Дожди в конце мая и ожидаемые осадки в начале июня оказались для озимых культур во многих районах Восточной Болгарии слишком запоздалыми, так как репродуктивные фазы их развития проходили при нарастающем дефиците почвенной влаги. На большей части восточных регионов прогнозируется сильное снижение урожайности, а в некоторых местах преждевременно пожелтевшие посевы с плохо выполненным колосом убираться не будут.

После более прохладной, чем обычно для этого времени года, погоды во второй половине первой декады прогнозируется улучшение термических условий. В течение декады у озимых зерновых культур на высоких полях будет происходить налив зерна. В низменных районах пшеница будет находиться в фазе молочной спелости, а к концу декады в некоторых местах также будет наблюдаться начало фазы восковой спелости. *В межфазный период от налива зерна до молочной спелости серьезные повреждения пшенице наносят личинки клопа-черепашки. В этот период необходимо проводить мониторинг посевов пшеницы на наличие вредителя, и если его плотность превысит экономический порог вредоносности, требуется своевременная обработка.*

В начале второй декады в низменных районах ячмень будет преимущественно в фазе восковой спелости, а рапс — в фазе созревания.

Во второй половине июня развитие сельскохозяйственных культур будет проходить ускоренными темпами. В конце второй и начале третьей декады пшеница будет преимущественно в фазе созревания.

К концу июня часть яровых культур вступит в репродуктивные фазы своего развития: у подсолнечника будет наблюдаться начало цветения, а у более ранних гибридов кукурузы — выметывание и цветение метелки.

Прогнозируемая в июне неустойчивая погода с частыми осадками создаст условия для развития ряда грибных заболеваний: милдью на виноградниках и овощных культурах, парши на плодовых деревьях и др. В течение месяца вероятность града останется повышенной. После градобития пораженные плодовые и овощные культуры необходимо при первой возможности обработать медьсодержащими фунгицидами.

Источник: НИМХ