

Защита растений у персика и абрикоса в конце июня и начале июля

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



У **персика** продолжаютсѧ обработки против мучнистой росы, дырчатой пятнистости, монилиоѧ, анарзии, восточной плоѧожорки и тлей.

Против мучнистой росы применяют один из следующих фунгицидов: Дифкор 250 ЕС – 20 мл/да, Эмбрения – 150 мл/да, Индар 5 EW – 150 мл/да, Карамат 2.5 EW – 300 мл/да, Козавет ДФ – 150 г/да, Кумулус ДФ – 750 г/да, Луна Экспириенс – 50 мл/да, Миклофил – 32-60 мл/да, Пассворд 25 ВГ – 50 г/да, Ритуал – 32-60 мл/да, Серкадис – 15 мл/да, Сигнум ВГ – 45 г/да, Систан 20 EW – 15-36 мл/да, Систан ЭѧоЗом EW – 65-200 мл/да, Сѧор 250 ЕС – 20-30 мл/да, Солфо 80 ВГ – 750 г/да, Сульгран – 500 г/да, Сѧра ВГ – 600 г/да, Тиовит Джет 80 ВГ – 600 г/да, Топаз 100 ЕС – 50 мл/да, Флосул СК – 500 мл/да,

Фонтелис СК – 120 мл/да, Гелиосера С – 125-500 мл/да, Геркулес 120 СК – 15-25 мл/да. Из перечисленных фунгицидов Индар 5 EW – 150 мл/да, Карамат 2.5 EW – 300 мл/да, Луна Экспириенс – 50 мл/да, Пассворд 25 ВГ – 50 г/да, Сигнум – 45 г/да, Систан 20 EW – 15-36 мл/да, Систан ЭкоЗом EW – 65-200 мл/да, Скор 250 ЕС – 20-30 мл/да, Фонтелис СК – 120 мл/да также эффективны против монилюоза и применяются для одновременной борьбы с обоими заболеваниями.

Против восточной плодовой гнили и антракноза применяют один из следующих инсектицидов: Авант 150 ЕС – 33.3 мл/да, Аффирм Опти – 200-225 г/да, Волиам Тарго 063 СК – 75 мл/да, Делегат 250 ВГ – 30 г/да, Имидан 50 ВГ – 150 г/да, Кораген 20 СК – 16-30 мл/да, Ламадекс Экстра – 70 г/да, Метеор – 90 мл/да, Суми Альфа 5 ЕС – 0.02%.

При высокой численности тлей проводят опрыскивание: Абанто – 60 мл/да, Аскот ВГ – 40-80 г/да, Дека ЕС/Деша ЕС/Дена ЕС/Полеци/Десижн – 30-50 мл/да, Децис 100 ЕС – 8.75-12.25 мл/да, Эстрела ВГ/Ламша ВГ/Адалам ВГ/Индулам ВГ – 40-80 г/да, Калипсо 480 СК – 20 мл/да, Ламадекс Экстра – 40-60 г/да, Мовенто 100 СК – 0.075-0.1%, Моспилан 20 СГ – 25 г/да, Натур Брейкер – 75 мл/да, Протеус О-ТЕК – 0.05% - 0.06%, Теппеки – 14 г/да.

У **абрикоса** проводят обработки, направленные против монилюоза, гномонии, дырчатой пятнистости, антракноза и восточной плодовой гнили. *Против монилюоза применяют один из следующих фунгицидов:* Делан 700 ВГ – 0.05%, Дифкор 250 ЕС – 20 мл/да, Эмбрения – 150 мл/да, Индар 5 EW – 150 мл/да, Карамат 2.5 EW – 300 мл/да, Луна Экспириенс – 50 мл/да, Пассворд 25 ВГ – 50 г/да, Сигнум ВГ – 30 г/да, Систан 20 EW – 12.5-30 мл/да, Хорус 50 ВГ – 40-50 г/да. Из указанных фунгицидов Делан 700 ВГ – 0.05%, Карамат 2.5 EW – 300 мл/да и Сигнум ВГ – 30 г/да также эффективны против гномонии. *Против антракноза и восточной плодовой гнили применяют один из инсектицидов, указанных для персика.*

Для того чтобы обработки против болезней и вредителей в плодовых культурах были эффективными, они должны проводиться своевременно и качественно. Кроме того, очень важно определить необходимость проведения той или иной обработки, что связано с проведением конкретного мониторинга для определения численности вредителя, и при превышении экономических порогов вредоносности следует проводить обработку.