

Регулярно проверяйте посевы на наличие обыкновенной полёвки в октябре и ноябре.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



В октябре и ноябре необходимо проводить обследование осенних посевов, и при превышении плотности популяции вредителя обыкновенной полёвки экономического порога вредоносности (2 активных колонии на декар) требуются защитные мероприятия.

Обыкновенная полёвка (*Microtus azvalis*) – распространена по всей территории страны. Наносит ущерб зерновым культурам, люцерне, рапсу, плодовым насаждениям и др. Обитает колониями в длинных ходах с различным количеством выходов на поверхность почвы. Обитаемые колонии определяются по разбросанным земляным кучкам, хорошо оформленному выходу и вложенным в него зеленым листьям. В теплые и сухие зимы репродуктивная способность полёвки очень высока. Размножается круглый год, а

потомство от одной пары может достигать до 2400 особей. Питается зелеными частями растений.

Повреждения наблюдаются от всходов до уборки урожая. При сильном заражении посевы изреживаются.

После уборки рекомендуется глубокая вспашка для уничтожения колоний и ликвидации возможной появляющейся сорной растительности, служащей пищей для полевки. При полевых обследованиях определяется плотность популяции полевки, и при наличии 2 активных колоний на декар в выходы (обитаемые) раскладываются отравленные приманки и притаптываются ногой для защиты птиц и полезной дичи. Обработка проводится родентицидами, разрешенными для этих целей (гранулы Фостоксина) – отравленными приманками, которые размещаются у входов в колонии.