

# Осадки и подходящие условия для посадки плодовых деревьев в ноябре

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



После продолжительной засухи осадки выше нормы в октябре, которые в некоторых районах Северной Болгарии превысили 70-80 л/м<sup>2</sup> (Н. село - 72 л/м<sup>2</sup>, Монтана - 71 л/м<sup>2</sup>, Кнежа - 80 л/м<sup>2</sup>, Плевен - 94 л/м<sup>2</sup>, Ловеч - 79 л/м<sup>2</sup>, Добрич - 75 л/м<sup>2</sup>), привели к значительному увеличению запасов влаги в верхних слоях почвы и улучшению условий для прохождения начальных фаз вегетации посеянных осенних культур. В конце октября на агрометеорологических станциях Силистра, Кнежа, София, Кюстендил, Новачене, Николаево, Павликени, Борима, Казанлык, Пазарджик, Пловдив в 50-сантиметровом слое для озимых зерновых культур уровни достигли и превысили 75-80% от полевой влагоёмкости.

В ноябре прогнозируемые осадки, около и выше месячной нормы, увеличат осенние запасы влаги в 50- и 100-сантиметровом почвенном слое.

В первой половине ноября развитие озимых зерновых культур и озимого рапса будет проходить умеренными темпами, при температурах, близких к климатическим нормам. В этот период у пшеницы, в зависимости от сроков посева, будут наблюдаться разные фазы – всходы, третий лист и кущение у ранних посевов, в конце сентября и начале октября.

В конце второй декады прогнозируется похолодание и существенное изменение агрометеорологических условий. На возвышенных полях, где не исключены осадки в виде снега, будет наблюдаться прекращение вегетационных процессов у осенних культур.

В течение третьей декады ноября развитие культур в большинстве полевых районов будет проходить замедленными темпами, при температурах, близких к биологическому минимуму, необходимому для вегетации озимых зерновых культур. Условия для более активных вегетационных процессов у пшеницы, ячменя и озимого рапса сложатся в южных и юго-восточных районах страны. В конце ноября будут преобладать посевы пшеницы и ячменя в фазе третьего листа.

В этом году засуха помешала своевременному посеву озимого рапса. По этой причине к концу ноября только часть посевов, в основном посеянных в начале осени, покажет начало фазы формирования розетки (5-6 листьев).

В ноябре прогнозируемые минимальные температуры, до минус 7°C, находятся выше критических уровней для осенних культур, находящихся на начальной стадии своего развития.

Более подходящие условия для посадки плодовых деревьев сложатся в первой половине месяца.

*Источник: НИМХ*