

'В саду в июле'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



В июле в **яблоневых садах**, где заражения паршой не произошло, опрыскивание против этого заболевания прекращают. При наличии инфекции на листьях и плодах и при частых дождях риск поздних заражений и увеличения степени повреждения плодов сохраняется, что в этом случае делает необходимым проведение обработок даже в этот период.

Для сортов яблони, восприимчивых к мучнистой росе, опрыскивание против этого заболевания также продолжается. Для одновременной борьбы с обоими заболеваниями используют один из следующих фунгицидов: Bellis – 80 г/да, Sulgran – 750 г/да и Kumulus – 600–900 г/да против мучнистой росы, а также Chorus 50 WG – 0,03%, Difcor 250 EC – 15 мл/да, Koprations Duo – 300 г/да, Scab – 300 мл/да и Captan 80 WG – 150–180 г/да против парши. Для одновременного контроля обоих заболеваний подходят

следующие: Flint Max 75 WG – 0,02%, Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 20–75 мл/да, Thiovit Jet 80 WG – 600 г/да, Revyona – 200 мл/да.

Чтобы предотвратить возникновение устойчивости у грибка, вызывающего паршу (*Venturia inaequalis*), лучше всего чередовать препараты с разным механизмом действия на патоген или использовать для борьбы с ним смеси фунгицидов.

Устойчивые к парше сорта – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novatak, Sava, Rubinola и др., опрыскивают только против мучнистой росы.

Для **груши** необходимо продолжать опрыскивание против парши, а также белой и бурой пятнистости листьев. Для борьбы с этими заболеваниями используют один из следующих фунгицидов: Difcor 250 EC – 15 мл/да, Luna Experience – 20–75 мл/да, Captan 80 WG – 150–180 г/да, Thiovit Jet 80 WG – 600 г/да.

Для **сливы** в июле опрыскивание направлено против монилиоза (серой гнили) и ржавчины. Против монилиоза опрыскивание проводят одним из следующих фунгицидов: Difcor 250 EC – 20 мл/да, Captan 80 WG – 150–180 г/да, Chorus 50 WG – 0,045%, Геохе – 40–60 г/да. Против ржавчины разрешён Signum WG – 45 г/да, который также эффективен против монилиоза.

В начале июля плоды ранних сортов персика начинают созревать, и в этот период их не опрыскивают.

Для **поздних сортов персика** продолжается борьба с мучнистой росой, дырчатой пятнистостью (клястероспориозом) и монилиозом. Против мучнистой росы используют один из следующих фунгицидов: Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 50 мл/да, Topaz 100 EC – 0,03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 г/да.

Для борьбы с монилиозом опрыскивание проводят препаратами Delan 700 WDG – 0,05%, Chorus 50 WG – 0,045% или Luna Experience – 63–75 мл/да.



В июле созревают абрикосы, и их не опрыскивают.

Для **малины** в этот период опрыскивание не проводят, за исключением **ремонтантных сортов**, таких как Люлин. Для них требуются обработки против дидимеллы и антракноза. Используют один из следующих фунгицидов: Signum WG – 100 г/да и Funguran OH 50 WP – 0,15%. При частых дождях и высокой влажности воздуха также необходимо опрыскивание против серой гнили. Используют Switch 62.5 – 100 г/да.

После сбора урожая листья **земляничных плантаций** скашивают, удаляют с плантации и уничтожают сжиганием или закапывают для перегнивания.