

Время осенней посадки малины

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 Брой: 11/2023



Малина обладает рядом преимуществ перед другими плодовыми видами – цветет позже, не страдает от весенних заморозков и плодоносит ежегодно. Ее плоды вкусные, питательные, с хорошими лечебными свойствами. Они укрепляют сердечную деятельность, обогащают организм витаминами и минеральными веществами, повышают аппетит. Известны своим жаропонижающим действием, что обусловлено наличием салициловой кислоты.

Выбор участка для посадки малины осуществляется в соответствии с требованиями культуры к климатическим и почвенным условиям. Предпосадочная подготовка почвы включает вспашку на 30–35 см, мелкую вспашку для заделки удобрений и культивацию. Вносятся навоз.

Наиболее подходящий период для посадки – с конца октября до наступления холодов. Посадка также возможна весной – до конца марта. Расстояние между рядами составляет от 1,8 до 2 м. Посадка производится вручную в борозды глубиной около 35 см.

Молодые насаждения удобряют 8–10 кг/да азота, а плодоносящие – 8–12 кг/да. На более тяжелых почвах азот вносят однократно, ранней весной, а на более легких – ранней весной и в конце мая. Подкормку плодоносящих насаждений проводят после цветения. При недостаточном количестве осадков проводят полив по необходимости до середины августа. Обрезку проводят ежегодно, при этом удаляют отплодоносившие двухлетние побеги и прореживают однолетние. На второй год после посадки оставляют 2–3 побега на растение для плодоношения, а остальные вырезают низко. На третий и четвертый год количество плодоносящих побегов увеличивается, и насаждения вступают в полное плодоношение. Весной обрезку проводят при набухании почек, удаляя поврежденные зимними морозами, болезнями и вредителями.

Уход за полукустарниками ягодных культур летом

Малина повреждается болезнями: дидимелла, антракноз, ржавчина, а среди вирусов – мозаика и хлороз жилок. Наиболее распространенные вредители малины – малинный жук, тли, *Agrilus*, малинная галлица, малинная стеблевая муха.



В България най-голямо разпространение получили следните сортове малини:

Люлин – плодове узряват от 27 август до 3 октомври. Те са големи, интензивно-червени, блестящи, плътни, с много добър вкус и умерен аромат. Растенията са силно развити и умерено растящи. Сортът е високопродуктивен и може да се отглежда без опорна конструкция.

Уиламетт – среднопродуктивен американски сорт. Плодове узряват в периода 6–8 юли. Те са средно големи, конически, с малки семена. Имат добър кисело-сладък вкус и аромат. Растенията умерено растящи, култивират се в по-прохладни региони в условията на орошение.

Български Рубин (Български Рубин) – плодове узряват в периода 28–30 юни. Те са средно големи, леко конически, рубиново-червени, не се разпадат на отделни костянки, имат приятен кисело-сладък вкус и умерен аромат. Сортът е високопродуктивен.

Шопска Елена – плодове узряват в периода 3–5 юли. Те са от средни до големи, тупоконически, ярко-червени, с умерен блясък и малки семена. Леко отделят се, имат много добър кисело-сладък вкус и умерен аромат. Подходящи за преработка и замразяване. Растенията силно развити, слабо покрити с малки шипове. Сортът е високопродуктивен.

