

# Агротехнически мероприятия в саду в июле

*Автор(и):* ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

*Дата:* 07.07.2024 *Брой:* 7/2024



В большинство дней второй и третьей декад июля ожидается относительно сухая и очень жаркая погода с максимальными температурами от 35 до 40<sup>0</sup>С. Прогнозируемые высокие температуры в июле и относительно сухая погода будут ограничивать развитие грибных заболеваний в многолетних насаждениях, за исключением мучнистых рос. Ожидаемые осадки около и ниже месячной нормы потребуют проведения усиленного режима орошения.

## *В плодовых питомниках*

Посевы регулярно поливают и обрабатывают для обеспечения максимально возможного процента стандартного подвойного материала. Маточные насаждения поливают и при необходимости окучивают.

Для обеспечения условий хорошего развития окулированных растений в отделениях второго года питомника при необходимости проводят обломку (ослепление) почек. Проводят регулярную обработку почвы и полив, особенно в питомниках груши.

В отделениях первого года питомника начинают окулировку подвоев, а там, где глазки не прижились, проводят повторную окулировку. Примерно через две недели после окулировки проверяют обвязки. Те, что врезались в кору, ослабляют.

### *В плодовых садах*

Продолжаются работы по отгибанию скелетных ветвей при формировании пальметтных деревьев.

С помощью орошения поддерживают влажность почвы выше 70% от полевой влагоемкости.

С помощью дисковых борон, культиваторов, фрез и фрез со смещенной секцией поверхность почвы в междурядьях и в рядах поддерживают в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.



Продолжается сбор черешни и вишни, а также начинается массовый сбор абрикосов и персиков.

### *В насаждениях земляники*

Продолжается уход за орошением вновь заложённых плантаций земляники, особенно посаженных в июне. В нижних и более теплых районах, где сбор плодов завершен, солому собирают, удаляют и сжигают.



Сбор плодов продолжается на более высоких и прохладных участках.

После удаления соломы плантации поливают и обрабатывают, предварительно внося 10-12 кг аммиачной селитры на декар.

Маточные насаждения, предназначенные для производства посадочного материала, поливают, удобряют 15-20 кг аммиачной селитры на декар и рыхлят. Усы на плантациях, с которых посадочный материал не берут, вырезают.

Определяют и подготавливают новые площади под плантации земляники для осенней посадки в открытый грунт. Перед глубокой обработкой участок удобряют 2-4 т навоза, 60-80 кг суперфосфата и 20-30 кг сульфата калия на декар.

*В насаждениях малины*

Продолжается уход за орошением и обработкой почвы на новых плантациях. Плодоносящие плантации поливают и обрабатывают. Норма полива составляет 50-60 дм<sup>3</sup> на декар.



Проводится массовый сбор плодов.

Осуществляют уход за маточными плантациями малины – полив и обработку почвы, чтобы обеспечить максимальное количество посадочного материала – отпрысков.

Плантации осматривают, удаляют примеси других сортов, а также старые отплодоносившие побеги срезают, собирают и сжигают.

### *В насаждениях черной смородины*

Продолжается уход за школками укоренения. Почву поливают и рыхлят, а на молодых и плодоносящих плантациях не допускают засорения сорняками.

Плантации удобряют азотом (1/3 годовой нормы).

Проводится массовый сбор плодов. Во время сбора отмечают примеси других сортов для последующей раскорчевки, а также больные и слабые растения. После сбора удаляют сломанные, недоразвитые и лишние побеги.

## *В насаждениях других культур*

Отмечают желаемые сорта и формы инжира для получения черенков. Берут черенки актинидии, лавра благородного, аронии, облепихи и граната для укоренения в теплице с искусственным туманом. Черенки подготавливают и обрабатывают раствором индолилмасляной кислоты в течение 5 секунд. Их укореняют в теплицах с искусственным туманом в субстрате из двух частей перлита и одной части торфа.

Начинают окулировку подвоев кавказской хурмы сортами хурмы и сеянцев актинидии культурными сортами.

Продолжается подвязка лоз актинидии к шпалере. Проводят летнюю обрезку актинидии. Шпалеру устанавливают уже при посадке, а проволоку поднимают на высоту 1-1,20 м и 1,80-2 м над поверхностью почвы.

Проводят окулировку зизифуса и фисташки.

Собирают плоды инжира, а к концу месяца начинают сбор плодов облепихи и аронии.