

# В начале февраля озимые культуры находятся в хорошем состоянии.

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 03.02.2025 *Брой:* 2/2025



Необычно высокие температуры в последнюю неделю января, достигшие 17-18°C во многих частях страны, а в отдельных районах Северной Болгарии – до и выше 20°C (Враца - 22°C, Плевен - 22°C, Ловеч - 22°C, Велико-Тырново - 23°C, Силистра - 20°C), привели к возобновлению вегетационных процессов у озимых культур на части полевых площадей страны. Превышающие норму январские температуры также нарушили период покоя у некоторых видов деревьев.

Озимые культуры в Добрудже находятся в хорошем общем состоянии, сообщает проф. д-р Иван Кирьяков, заведующий отделом «Селекция зерновых и зернобобовых культур» в Добруджанском сельскохозяйственном институте – Генерал-Тошево. Пшеница, в зависимости от сроков сева, находится

на разных этапах своего развития – одни посевы выходят из кущения, другие находятся в начале фазы. Его рекомендация – отложить подкормку до второй половины февраля.

Культуры в Южной Болгарии также развиваются нормально и находятся в стадии кущения. Повреждений от болезней, вредителей или зимних вымерзаний пшеницы не наблюдалось, поделился с нами доц. д-р Евгений Димитров из Института генетических ресурсов растений «К. Малков» в Садово. Там азотная подкормка пшеницы обычно начинается в начале февраля.

Ограничивающим фактором для развития культур по всей стране является влажность в почвенном слое, которая в условиях южных регионов страны в последние годы характеризуется очень низким уровнем, значительно ниже нормы.

После несвоевременной теплой погоды к концу недели агрометеорологические условия претерпят изменения, которые будут существенными во второй половине периода. Ожидаемое похолодание остановит преждевременную вегетацию озимых зерновых культур и сдержит нежелательное начальное развитие плодовых деревьев.

В течение периода критические минимальные температуры для перезимовки сельскохозяйственных культур не прогнозируются.

Более подходящие условия для проведения обработки почвы и обрезки в виноградниках и садах возникнут в начале периода.

*foto© bluedesign - Fotolia.com*

*Источник: НИМХ и Agri.bg*