


Агротехнически мероприятия в саду в мае

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025



В мае агрометеорологические условия будут определяться неустойчивой погодой, с температурами и осадками, близкими к климатическим нормам для этого месяца. В течение месяца у плодовых культур, не пострадавших от весенних заморозков, будет происходить формирование и увеличение завязи.

Средняя температура в мае будет около и выше нормы, которая составляет от 24 до 25 °С в большинстве районов, 20-23 °С на черноморском побережье и от 5 до 15 °С в горах.

Месячная сумма осадков будет средней по стране и составит около и ниже нормы, которая для равнин составляет от 50 до 70 л/кв. м, а в горных районах — от 80 до 100 л/кв. м.

Над Западной и Центральной Болгарией ожидаются количества, близкие к климатической норме в 60-90 л/кв. м. Вероятность осадков значительно ниже в Восточной Болгарии, где погода будет чаще солнечной и несколько суше. Ожидаемые там осадки будут ниже климатических норм — до 35-40 л/кв. м.

К концу первой декады дневные значения достигнут 28-33 °С, а в отдельных местах до 35 °С, что ускорит вегетационные процессы у плодовых культур. Будет много солнечных часов и осадков во второй половине дня, в основном над горами.

В течение первой декады месяца значительные количества осадков выпадут в основном в Западной и Центральной Болгарии. Также высока вероятность града. Дневные температуры составят 23-25 °С, а над Восточной Болгарией немного ниже — до 20-22 °С.

Вторая декада начнется с большего количества солнечных часов. Температуры останутся близкими к обычным значениям. Вероятность осадков будет ниже в Восточной Болгарии. Дневные температуры будут близки к норме для мая и составят от 25 до 29 °С, а над Восточной Болгарией — 24-25 °С.

К концу второй декады мая ожидается небольшое понижение и более низкие температуры. Атмосфера снова станет неустойчивой. Сформируются условия для осадков, града и гроз, а выше 2000-2200 м над уровнем моря — также для снега.

В случае градобития целесообразно обработать пострадавшие посадки при первой возможности медьсодержащими фунгицидами для обеспечения более быстрого заживления ран и снижения риска вторичных инфекций патогенами.

В первые дни третьей декады погода будет неустойчивой и останется холодной для этого периода. Во многих местах во второй половине дня будут кратковременные ливни с грозами. К концу периода осадки уменьшатся, а температуры повысятся, что приведет к ускоренному развитию плодовых культур. Также ожидается период засухи, при котором осадки будут выпадать в меньшем количестве мест. Дневные значения составят от 25-27 °С до 23-24 мая и 35-37 °С к концу месяца.

В плодовых питомниках

В питомниках следят за правильным развитием привитых почек. При необходимости проводят новое удаление побегов, появляющихся из подвоя. При риске вставания ослабляют обвязки подвоев, перепривитых весной. Обрабатывают семенные грядки, маточные насаждения и питомники. При необходимости прореживают растения на семенных грядках.

В плодовых садах



По окончании цветения ульи перемещают на другое место — на расстояние не менее 5 км.

В новых посадках персиковых садов с вазообразной или улучшенной вазообразной кроной проводят формирующую обрезку.



Следят за правильной приживаемостью и развитием деревьев в новых посадках — проводят рыхление, удаление побегов, полив при необходимости. Деревья в молодых густых насаждениях подвязывают к проволочной шпалере. Сильные двух- и трехлетние ветви отгибают и подвязывают к проволоке, чтобы уменьшить их вегетативную силу. В молодых — 2- и 3-летних насаждениях удаляют часть завязи на лидере — центральной ветви. Продолжается прореживание плодов персика.

После окончательного завершения июньского опадения завязи сады поливают. Органическую массу от сидеральных культур запахивают.

Почву содержат свободной от сорняков и рыхлой путем регулярных неглубоких обработок культиватором или бороной.

В конце месяца плодоносящие деревья подкармливают 15-20 кг/дка аммиачной селитрой или таким же количеством другого азотного удобрения с последующей неглубокой обработкой почвы. В случае засухи проводят полив.



Продолжается сбор ранних сортов черешни.

В посадках земляники

Продолжается весенне-летняя посадка охлажденной рассады земляники. После посадки применяют дождевание. Пропалывают площади, засаженные в апреле. В более высоких районах к концу месяца под цветоносы подстилают солому.



Продолжается сбор урожая. При транспортировке плодов на более дальние расстояния их можно собирать немного раньше.

В случае засухи во время созревания плодов необходим полив дождеванием или поверхностный (гравитационный).

В посадках малины

Проводят регулярную обработку почвы. Побеги некоторых сортов подвязывают к опорной конструкции, а для остальных сортов следят, чтобы они не сгибались в междурядья. Во время цветения желательно обеспечить две пчелиные семьи на 10 дка.

В посадках черной смородины



Продолжается уход за отводковыми грядками — обработка и полив. Удаляют слабые и лишние прикорневые побеги. В случае засухи проводят обильный полив. Начинаются работы по организации сбора плодов черной смородины.

В посадках других культур

Подвои лимона окулируют растущей почкой. Продолжается прививка хурмы.

Поверхность почвы содержат свободной от сорняков и регулярно рыхлят путем неглубокой обработки. До второй декады обеспечивают частые и регулярные поливы.



Продолжается посадка *Actinidia chinensis* в открытый грунт. После посадки проводят полив. Лозы киви регулярно подвязывают к вспомогательным опорным ветвям. Ствол не должен обвиваться вокруг опорной ветви, и боковые побеги на нем удаляют. Обеспечивают три пчелиные семьи на 10 дка посадок киви.