

Полевые мыши ищут пищу в садах

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Если вы обнаружите, что кора вокруг корневой шейки плодовых деревьев обгрызена, а у некоторых обгрызен и камбий, это повреждения, нанесённые мышами. Их нашествие в прошлом году было массовым в плодовых садах, сильно заросших сорняками.

В плодовых садах мыши питаются обильной травянистой растительностью или многочисленными опавшими червивыми плодами до наступления зимних морозов, даже после выпадения снега. Они начинают питаться корой корневой шейки и корней после того, как пройдут зимние морозы, когда травянистая растительность высохнет, а опавшие плоды уже сгниют. Наибольший вред плодовым растениям они наносят в период с января до конца марта.

Вы должны тщательно осмотреть свои сады. Если вы обнаружите колонии мышей, немедленно удалите мульчу – сухие листья и траву в междурядьях, с помощью мотыги или

плуга. Разложите отравленные приманки в норы. Приготовьте их из зёрен кукурузы или пшеницы, отваренных до мягкости, и смешайте с фосфидом цинка (30 г фосфида цинка на 1 кг кукурузы или пшеницы). Разместите приманки вокруг стволов и у входов в норы. Обязательно прикройте их, чтобы не отравить птиц.