

Новые вредители томатов – желтополосная совка

Автор(и):

Дата: 13.03.2016 Брой: 3/2016



Среди вредителей с высоким риском для стран региона ЕОЗР находятся следующие виды из семейства Noctuidae:

***Spodoptera ornithogalli* (Lepidoptera: Noctuidae) (“желтополосая совка”)**

Растения-хозяева: Полифаг, поражает широкий спектр растений, таких как: томат, перец, баклажан, картофель, табак, лук, арахис, семейства Brassicaceae, Cucurbitaceae, хлопчатник, лён, рис, кукуруза, фасоль, горох, соя, подсолнечник, люцерна, морковь, огурец, сахарная свёкла, спаржа.

Вред: Бабочка отклажда яйца на листа. После вылупления личинки питаются ими, а также плодами томата, перца и хлопчатника. Вредитель окукливается в почве. *S. ornithogalli* упоминается как серьёзный вредитель на юге США на овощных культурах, таких как томат, перец, бобовые, тыквенные, а также на табаке, сое, кукурузе и люцерне.

Распространение: На короткие расстояния распространяется с помощью лёта взрослых особей.

Пути проникновения: В новые районы вредитель заносится с овощными плодами, посадочным материалом и срезанными цветами растений-хозяев, происходящих из стран, где встречается *S. ornithogalli*.

Возможный риск: *S. ornithogalli* поражает множество культур, имеющих первостепенное значение для Европы. Согласно исследованиям Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОЗР), существует высокий риск проникновения вредителя в регион. Он не может перезимовать на севере, но в течение вегетационного периода вероятно его распространение и закрепление в теплицах.