

Грибок корневой гнили (*Heterobasidium annosum*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2016 Брой: 6/2016



Проведенные лесопатологические обследования станциями защиты леса – София, Пловдив, Варна, указывают, что в ветровальных насаждениях в указанных регионах, а также в большинстве ельников и культур на Витоше, также наблюдаются поражения корневой губкой (*Heterobasidium annosum*). Этот гриб развивается в ядровой древесине ели, пихты и македонской сосны на протяжении нескольких десятилетий, достигая высоты 7–8 м, в отдельных случаях и более, без каких-либо видимых внешних симптомов. Во время сильных, ураганных ветров или при обильном мокром снеге стволы обламываются на высоте, соответствующей развитию гнили древесины, вызванной грибом.

В последние годы общая площадь заражения наиболее быстро увеличивается в регионах областных дирекций лесного хозяйства Кюстендил, Благоевград и София. В этих

насаждениях и культурах запланированы санитарные рубки. Увеличения площади и интенсивности поражений этим грибом можно ожидать в хвойных насаждениях в возрасте 30–40 лет в Западных Родопах, созданных на бывших сельскохозяйственных землях, а также в спелых ельниках Витоши, Пирина и Рилы.