

# 'Гусеницы, объедающие листья, являются основными вредителями плодовых деревьев'

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 20.06.2016 Брой: 6/2016



*Обычно вредители специализируются на питании одним или несколькими видами растений. Но есть одна группа, которая «не выбирает» – группа многоядных вредителей.*

Мягкая зима создала благоприятные условия для перезимовки и размножения так называемых листогрызущих гусениц – непарного шелкопряда, кольчатого коконопряда, златогузки, золотистого шелкопряда и др. – бабочек. Поэтому этой весной наблюдался «бум» их вредоносной активности. Их гусеницы объедали листья и цветочные почки многих плодовых видов – яблони, айвы, груши, сливы, абрикоса, черешни, вишни, мушмулы, уже ранней весной и продолжали свою вредоносную деятельность в апреле–мае, когда, уже подросшие, они питаются наиболее прожорливо. Они потребили большое количество листовой массы, повредили плодовые почки и даже оголили некоторые деревья.

Против листогрызущих гусениц необходимо применять комплексную стратегию борьбы.

### **Первый шаг в борьбе с листогрызущими гусеницами предпринимается уже осенью**

Сады должны содержаться в хорошем состоянии, потому что физиологически ослабленные деревья подвергаются более сильным атакам. Уже осенью предыдущего года, чтобы сократить их численность, удалите и уничтожьте засохшие и зараженные яйцевыми кольцами ветки, соберите и сожгите гнезда гусениц, соскоблите старую потрескавшуюся кору (тупым ножом, чтобы не повредить камбий). После обрезки замажьте раны масляной краской, садовой замазкой или готовой пастой.

### **Химическая борьба**

Химическая борьба с листогрызущими гусеницами эффективна в основном до цветения, когда плотность вредителя высока. Цельтесь в гусениц, но вы можете рассчитывать на успех только если они не старше третьего возраста. «Взрослые» особи препаратами не поражаются. Гусениц златогузки и кольчатого коконопряда легко узнать, потому что они очень крупные – достигают 6–8 см, окрашены в серо-коричневый цвет, с пучками длинных волосков на теле, с синими и винно-красными бородавками, желтыми полосами и крупной серой головой.

Во время цветения в садах вас также могут неприятно удивить гусеницы пядениц. Они бывают разных видов и по-разному окрашены, но все имеют одну характерную особенность – при движении они подтягивают заднюю часть тела к передней, в результате чего получается похожее на размах «отмеривающее» движение. Присутствие пядениц в саду легко установить. Если вы громко хлопнете в ладоши рядом с цветами, гусеницы сразу поднимают головы и замирают неподвижно – в этой позе они напоминают сухую веточку.

Когда плодовые деревья цветут, некоторые листовертки также наносят ущерб, связывая цветы и листья легкой паутиной. Они больше размножаются в садах, где почва не обрабатывается или которые находятся близко к лесным насаждениям. Опрыскивание проводится во время цветения бактериальными препаратами.

Уже середина июня, и вы можете немного расслабиться от этих вредителей, но не забывайте о них и начинайте свои меры борьбы с ними уже осенью!