

Плесень на листьях томатов

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



*Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев – это заболевание, поражающее томаты, выращиваемые в теплицах или под плёночными укрытиями. Однако при очень влажной погоде его также наблюдают на грядках открытого грунта и в садах. Возбудитель – *Cladosporium fulvum*.*

Первые видимые симптомы болезни следует искать на листьях нижних ярусов растений. На верхней стороне листьев наблюдаются бледные, размытые пятна; на нижней стороне образуется светлый, а позже бархатистый налёт. На одном листе может развиваться множество пятен. Поражённые ткани некротизируются, а при сильном заражении повреждённые листья опадают.

Стратегии борьбы с вредителем:

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в теплицах, влажность воздуха ниже 70% и температуру 18-22°C.
- Сбалансированное минеральное питание;

- Благоприятный водный и воздушный режим;
- Устойчивые сорта;
- Обеззараживание почвы после окончания периода вегетации;
- При появлении заболевания обработайте одним из разрешённых фунгицидов.

Разрешённые средства защиты растений:

SYNSTAR – 70-80 мл/га и CIDELY TOP – 100 мл/га, SINGUN – 100-150 г/га (срок его регистрации истекает 09.06.2017).