

Агрометеорологический прогноз на первую половину марта

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.03.2017 Брой: 3/2017



В первой половине марта агрометеорологические условия будут характеризоваться повышенной динамикой. После кратковременного понижения температур в начале месяца, в первую неделю марта ожидается значительное улучшение термических условий. Прогнозируемые температуры выше нормы, с максимальными значениями до 20°C, приведут к активизации вегетации у озимых культур и у раноцветущих плодовых насаждений в земледельческих районах страны.

Высокие максимальные температуры в конце февраля, достигавшие в отдельных местах 21-23°C (Видин, Враца, Ловеч, Велико-Тырново, Пазарджик), возобновили вегетационные процессы у пшеницы, ячменя и озимого рапса и нарушили вынужденный покой у части многолетних насаждений.

В первой половине марта агрометеорологические условия будут характеризоваться повышенной динамикой. После кратковременного понижения температур в начале месяца, в первую неделю марта ожидается значительное улучшение термических условий. Прогнозируемые температуры выше нормы, с максимальными значениями до 20°C, приведут к активизации вегетации у озимых культур и у раноцветущих плодовых насаждений в земледельческих районах страны.

В конце первой и в первой половине второй декады агрометеорологические условия будут определяться температурами около и ниже климатических норм, что будет сдерживать развитие сельскохозяйственных культур. В Северной Болгарии и на высоких полях, где не исключены осадки, в том числе и снег, будет наблюдаться ослабление и прекращение вегетации у озимых культур. В Южной Болгарии значения среднесуточных температур будут близки к биологическому минимуму, необходимому для развития озимых зерновых культур и озимого рапса.

К середине марта у плодовых культур в южных районах страны у раноцветущих видов (миндаль, абрикос, персик) будут проходить фазы набухания и распускания почек. В течение периода критические минимальные температуры для культур в равнинных районах не прогнозируются.

Частые осадки в первой половине месяца будут затруднять во многих районах страны своевременное проведение сезонных агротехнических мероприятий – подкормку озимых культур азотными минеральными удобрениями, предпосевную обработку почвы и посев ранних яровых культур (вика, овес, горох, яровой ячмень). Более благоприятные условия для проведения предцветковых опрыскиваний в садах ожидаются в первую неделю марта и в начале второй декады.

Источник: НИМХ-БАН