

Защита растений в виноградниках в июле

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



В этот период виноградная лоза находится в фенологической стадии от «окончания цветения» до «начала созревания ягод» у ранних сортов.

Основные вредители за период

Мильдю винограда *Plasmopara viticola*

Оидиум *Oidium tuckeri*

Серая гниль *Botrytis cinerea*

Бактериальный рак *Agrobacterium vitis*

Виноградная листовёртка *Lobesia botrana*

Виноградная пестрянка *Theresimima ampellophaga*

Виноградный мучнистый червец *Pulvinaria vitis*

Виноградный паутинный клещ *Schizotetranychus viticola*

Бактериальный рак

У заражённых растений на одревесневших частях, близко к поверхности почвы или непосредственно под ней, наблюдаются вздутия (опухоли). Больные растения отличаются угнетённым ростом, хлоротичными листьями и легко вымерзают в холодную зиму.

Стратегия борьбы с вредителем:

В июле необходимо отметить кусты, проявляющие симптомы заболевания.

Виноградный мучнистый червец

Вылупление личинок продолжается в первой половине июля. Они наносят вред, высасывая сок из листьев, побегов и гроздей. Они линяют один раз, питаются определённый период, затем покидают места питания и перемещаются в места зимовки. В результате повреждений лоза ослабевает.

Стратегия борьбы с вредителем:

Химическая обработка проводится против молодых личинок.

Разрешённое средство защиты растений:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

