

Рапсовый листоед – *Psylloides Chrysocephala*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.10.2017 Брой: 10/2017



Вред:

Рапсовый стеблевой скрытнохоботник распространен повсеместно и при

высокой плотности популяции наносит огромный ущерб. Вредитель развивает одно

поколение в год. Зимует в стадии яйца, личинки и взрослого насекомого.

В сентябре жуки начинают интенсивно питаться, а с конца сентября до середины декабря откладывают яйца. Вылупившиеся личинки сначала внедряются в эпидермис стеблей, а позже — в черешки и центральные жилки листьев. Часть личинок отрождается весной.

Родственным видом рапсового стеблевого скрытнохоботника является Малый рапсовый скрытнохоботник. Другие вредоносные виды на рапсе: чёрная, светлоногая, волнистая, льняная, конопляная и другие виды блошек.

Меры борьбы:

3 Химическую обработку применяют при достижении экономического порога вредоносности: 2 жука/м² в фазе всходов; 4 жука/м² после появления 3-го листа; 3–5 личинок на растение.

Зарегистрированные инсектициды для борьбы:

Маврик 2 F – 30 мл/да; Цитрин Макс – 5 мл/да; Дека ЕС – 30 мл/да; Децис 100 ЕС – 5 мл/да; Дукат 25 ЕС – 30 мл/да; Магеос – 5 г/да; Нурелл D – 60 мл/да; Пиринекс Суприм 3V – 60 мл/да; Шерпа 100 EW – 25 мл/да.